



INLYTA[®]
(Axitinib)

Tabletas Recubiertas

1. NOMBRE DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO

INLYTA 1 mg Tabletas recubiertas.

INLYTA 5 mg Tabletas recubiertas.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada tableta recubierta de INLYTA 1 mg y 5 mg contiene: 1 mg y 5 mg de axitinib, respectivamente.

Excipiente(s)

Para obtener una lista completa de excipientes, ver sección 15.1.

Excipientes con efecto conocido:

INLYTA 1 mg tabletas recubiertas: cada tableta recubierta contiene 33.6 mg de lactosa monohidrato.

INLYTA 5 mg tabletas recubiertas: cada tableta recubierta contiene 58.8 mg de lactosa monohidrato.

3. VIA DE ADMINISTRACIÓN

Administración oral.

4. FORMA FARMACÉUTICA

Tabletas recubiertas.

5. INDICACIONES Y USO

INLYTA como agente único está indicado para el tratamiento del carcinoma avanzado de células renales (CCR) tras fracaso de un tratamiento sistémico previo.

6. DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

6.1 Dosis recomendada

Cuando se administra INLYTA como agente único, la dosis oral inicial recomendada es de 5 mg dos veces al día. Administre las dosis de INLYTA con aproximadamente 12 horas de separación, con o sin alimentos.

Instrucciones Importantes para la Administración

Se debe aconsejar a los pacientes deglutir INLYTA de manera íntegra con un vaso lleno con agua. Si el paciente vomita u omite una dosis, no se debe tomar una dosis adicional. Se debe aconsejar al paciente que tome su próxima dosis prescrita a la hora habitual.

6.2 Directrices de Modificación de la Dosis

Se recomienda el aumento o reducción de la dosis basado en la seguridad y la tolerabilidad individual.

Los aumentos y reducciones de dosis recomendados de INLYTA se proporcionan en la Tabla 1.

En el transcurso del tratamiento, los pacientes que toleren INLYTA por lo menos durante dos semanas consecutivas, sin reacciones adversas Grado >2 (de acuerdo con los Criterios de Toxicidad Comunes para Reacciones Adversas [CTCAE por sus siglas en inglés]), sean normotensos, y no estén recibiendo tratamiento antihipertensivo, pueden tener un incremento de su dosis.

Tabla 1: Aumentos y reducciones de dosis recomendadas para INLYTA

Modificación de Dosis	Régimen de Dosis
Dosis inicial recomendada	5 mg dos veces al día
Aumento de dosis	
Primer aumento de dosis	7 mg dos veces al día
Segundo aumento de dosis	10 mg dos veces al día
Reducción de dosis^a	
Primera reducción de dosis ^b	3 mg dos veces al día
Reducción de la segunda dosis	2 mg dos veces al día

^a: Para el manejo de reacciones adversas a medicamentos.

^b: A partir de 5 mg dos veces al día.

Las modificaciones de dosis recomendadas para las reacciones adversas de INLYTA se proporcionan en la Tabla 2.

Tabla 2: Modificación de la dosis recomendada de INLYTA para Reacciones Adversas

Reacción Adversa	Gravedad	Modificaciones de la dosis de INLYTA
Hipertensión [<i>ver Advertencias y Precauciones (8.1)</i>]	Presión arterial sistólica (PAS) > 150 mmHg o presión arterial diastólica (PAD) > 100 mmHg a pesar de tratamiento antihipertensivo	<ul style="list-style-type: none"> Reducir la dosis en un nivel.
	PAS > 160 mmHg o PAD > 105 mmHg.	<ul style="list-style-type: none"> Suspender hasta presión arterial (PA) < 150/100 mmHg. Reanudar a una dosis reducida.
	Grado 4 o crisis hipertensiva	<ul style="list-style-type: none"> Descontinuar permanentemente.
Hemorragia [<i>ver Advertencias y Precauciones (8.4)</i>]	Grado 3 o 4	<ul style="list-style-type: none"> Retener hasta la resolución a Grado 0 o 1 o línea de base. O reanude a una dosis reducida o suspenda dependiendo de la gravedad y persistencia de la reacción adversa.
Insuficiencia cardíaca [<i>ver Advertencias y Precauciones (8.5)</i>]	Miocardiopatía asintomática (fracción de eyección del ventrículo izquierdo superior al 20% pero inferior al 50% por debajo del valor inicial o por debajo del límite inferior normal si no se obtuvo el valor inicial)	<ul style="list-style-type: none"> Retener hasta la resolución a Grado 0 o 1 o línea de base. Reanudar a una dosis reducida.
	Insuficiencia cardíaca congestiva manifestada clínicamente	<ul style="list-style-type: none"> Descontinuar permanentemente.
Deterioro de la cicatrización de heridas [<i>ver Advertencias y Precauciones (8.8)</i>]	Cualquier grado	<ul style="list-style-type: none"> No se ha establecido la seguridad de la reanudación de INLYTA después de la resolución de la cicatrización de heridas. O reanude a una dosis reducida o suspenda dependiendo de la gravedad y persistencia de la reacción adversa.
Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible [<i>ver Advertencias y Precauciones (8.9)</i>]	Cualquier grado	<ul style="list-style-type: none"> Descontinuar permanentemente.
Proteinuria [<i>ver Advertencias y Precauciones (8.10)</i>]	2 o más gramos de proteinuria por 24 horas	<ul style="list-style-type: none"> Retener hasta la resolución a menos de 2 gramos por 24 horas. Reanudar a una dosis reducida.
Otras reacciones adversas	Grado 3	<ul style="list-style-type: none"> Reduzca la dosis en un nivel.
	Grado 4	<ul style="list-style-type: none"> Retención hasta resolución a Grado 2. Reanudar a una dosis reducida.

6.3 Modificación de la Dosis por Interacciones Farmacológicas

Inhibidores Potentes de CYP3A4/5

Debe evitarse el uso concomitante de inhibidores potentes de CYP3A4/5 (por ejemplo, ketoconazol, itraconazol, claritromicina, atazanavir, indinavir, nefazodona, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telitromicina y voriconazol). Se recomienda la selección de una medicación concomitante alternativa que no tenga potencial de inhibición del CYP3A4/5 o bien sea mínimo. Aunque no se ha estudiado el ajuste de la dosis de INLYTA en pacientes que reciben inhibidores potentes de CYP3A4/5, si un inhibidor potente de CYP3A4/5 debe ser administrado simultáneamente, se recomienda una disminución de la dosis de INLYTA aproximadamente a la mitad, ya que se pronostica que esta reducción de la dosis de axitinib ajustará el área bajo la curva (ABC) de la concentración plasmática frente al tiempo al rango observado sin inhibidores. Las dosis siguientes pueden aumentar o disminuir según la seguridad y tolerabilidad individual. Si se interrumpe la coadministración del inhibidor potente, se debe regresar a la dosis de INLYTA (después de 3 a 5 vidas medias del inhibidor) utilizada antes del inicio del inhibidor potente de CYP3A4/5 [ver *Interacciones Farmacológicas (10.1)* y *Farmacología Clínica (13.3)*].

6.4 Modificación de la Dosis para Insuficiencia Hepática

No es necesario ajustar la dosis inicial para la administración de INLYTA en pacientes con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh clase A). En base a los datos farmacocinéticos, la dosis inicial de INLYTA se debe reducir aproximadamente a la mitad en pacientes con insuficiencia hepática basal moderada (Child-Pugh clase B). Las dosis siguientes pueden aumentar o disminuir según la seguridad y tolerabilidad individual. No se ha estudiado INLYTA en pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh clase C) [ver *Advertencias y Precauciones (8.12)*, *Uso en Poblaciones Específicas (11.6)* y *Farmacología Clínica (13.3)*].

7. CONTRAINDICACIONES

Ninguna.

8. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

8.1 Hipertensión

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de los pacientes con CCR, se informó hipertensión en 145/359 pacientes (40%) que recibieron INLYTA y 103/355 pacientes (29%) que recibieron sorafenib. Hipertensión de Grado 3/4 se observó en 56/359 pacientes (16%) que recibieron INLYTA y 39/355 pacientes (11%) que recibieron sorafenib. Se informó crisis hipertensa en 2/359 pacientes (<1%) que recibían INLYTA y ninguno de los pacientes que recibieron sorafenib. La mediana del tiempo de inicio para la hipertensión (presión arterial sistólica >150 mmHg o presión arterial diastólica >100 mmHg) estuvo dentro del primer mes tras el comienzo del tratamiento con INLYTA y los incrementos en la presión arterial fueron observados tempranamente tras 4 días después de comenzar el tratamiento con INLYTA. La hipertensión fue controlada con tratamiento antihipertensivo estándar. La interrupción del tratamiento con INLYTA debido a la hipertensión ocurrió en 1/359 pacientes (<1%) que recibieron INLYTA y ninguno de los pacientes tratados con sorafenib [ver *Reacciones adversas (9.1)*].

Asegúrese de que la presión arterial esté bien controlada antes de iniciar INLYTA. Supervise a los pacientes en busca de hipertensión y trátelos según sea necesario con la terapia antihipertensiva estándar. Suspenda y luego reduzca la dosis de INLYTA o suspenda permanentemente según la gravedad de la hipertensión [ver *Dosis y Administración (6.2)*].

8.2 Eventos Tromboembólicos Arteriales

En los ensayos clínicos, se han informado eventos tromboembólicos arteriales, incluso muertes. En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, se registraron episodios tromboembólicos arteriales de Grado 3/4 en 4/359 pacientes (1%) que recibieron INLYTA y 4/355 pacientes (1%) que recibieron sorafenib. Se informó accidente cerebrovascular fatal en 1/359 pacientes (<1%) que recibieron INLYTA y en ninguno de los pacientes tratados con sorafenib [ver *Reacciones Adversas (9.1)*].

INLYTA no se ha estudiado en pacientes que tuvieron un evento tromboembólico arterial en los 12 meses anteriores. En los ensayos clínicos con INLYTA, se informaron eventos tromboembólicos arteriales (que incluyen ataque isquémico transitorio, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y oclusión de la arteria de la retina) en 17/715 pacientes (2 %), con dos muertes secundarias a un accidente cerebrovascular.

Interrumpa permanentemente INLYTA si ocurre un evento tromboembólico arterial durante el tratamiento.

8.3 Eventos Tromboembólicos Venosos

En los ensayos clínicos, se han informado eventos tromboembólicos venosos, incluso muertes. En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, se informaron eventos tromboembólicos venosos en 11/359 pacientes (3%) que recibieron INLYTA y 2/355 pacientes (1%) que recibieron sorafenib. Fueron informados episodios tromboembólicos venosos de Grado 3/4 en 9/359 pacientes (3%) que recibieron INLYTA (incluidos embolia pulmonar, trombosis venosa profunda, oclusión venosa de la retina y trombosis venosa de la retina) y 2/355 pacientes (1%) que recibieron sorafenib.

INLYTA no se ha estudiado en pacientes que tuvieron un evento tromboembólico venoso en los 6 meses previos. En ensayos clínicos con INLYTA, se informaron eventos tromboembólicos venosos en 22/715 pacientes (3 %), con dos muertes secundarias a embolia pulmonar.

Vigile los signos y síntomas de tromboembolismo venoso (TEV) y embolia pulmonar (EP). Suspenda INLYTA y luego reanude con la misma dosis o suspenda permanentemente según la gravedad del TEV.

8.4 Hemorragia

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de los pacientes con CCR, se informaron eventos hemorrágicos en 58/359 pacientes (16%) que recibieron INLYTA y 64/355 pacientes (18%) que recibieron sorafenib. Se informaron eventos hemorrágicos de Grado 3/4 en 5/359 (1%) de los pacientes que recibieron INLYTA (incluido hemorragia cerebral, hematuria, hemoptisis, hemorragia gastrointestinal inferior y melena) y 11/355 (3%) de los pacientes que recibieron sorafenib. Se informó hemorragia fatal en 1/359 pacientes (<1%) que recibieron INLYTA (hemorragia gástrica) y 3/355 (1%) que recibieron sorafenib.

INLYTA no ha sido estudiado en pacientes que tienen evidencia de metástasis cerebrales no tratadas o sangrado gastrointestinal activo reciente y no debe ser administrado en estos pacientes. Retenga y luego reduzca la dosis de INLYTA o suspenda según la gravedad y la persistencia de la hemorragia.

8.5 Insuficiencia Cardíaca

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, se reportó insuficiencia cardíaca en 6/359 pacientes (2%) que recibieron INLYTA y 3/355 pacientes (1%) que recibieron sorafenib. Se observó una insuficiencia cardíaca Grado 3/4 en 2/359 pacientes (1%) que recibieron INLYTA y 1/355 pacientes (<1%) que recibieron sorafenib. Se reportó insuficiencia cardíaca mortal en 2/359 pacientes (1%) que recibieron INLYTA y 1/355 pacientes (<1%) que recibieron sorafenib. Monitoree los signos o síntomas de insuficiencia cardíaca durante todo el tratamiento con INLYTA. El manejo de la insuficiencia cardíaca puede requerir la reducción de la dosis, la interrupción de la dosis o la suspensión permanente de INLYTA [ver *Dosis y Administración* (6.2)].

8.6 Perforación Gastrointestinal y Formación de Fístula

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, se informó perforación gastrointestinal en 1/359 pacientes (<1%) que recibieron INLYTA y en ninguno de los pacientes que recibieron sorafenib. En los ensayos clínicos con INLYTA, se informó perforación gastrointestinal en 5/715 pacientes (1%), incluida una muerte. Además de los casos de perforación gastrointestinal, se informaron fístulas en 4/715 pacientes (1%).

Monitoree los síntomas de la perforación gastrointestinal o fístula periódicamente durante el tratamiento con INLYTA.

8.7 Disfunción Tiroidea

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de los pacientes con CCR, se informó hipotiroidismo en 69/359 pacientes (19%) que recibieron INLYTA y 29/355 pacientes (8%) que recibieron sorafenib. Se informó hipertiroidismo en 4/359 pacientes (1%) que recibieron INLYTA y 4/355 pacientes (1%) que recibieron sorafenib. En pacientes que tuvieron hormona estimulante de la tiroides (TSH) <5 $\mu\text{U/mL}$ antes del tratamiento, se produjo un aumento de la TSH a ≥ 10 $\mu\text{U/mL}$ en 79/245 pacientes (32%) que recibieron INLYTA y 25/232 pacientes (11%) que recibieron sorafenib [ver *Reacciones Adversas (9.1)*].

Monitoree la función tiroidea antes de iniciar, y periódicamente durante, el tratamiento con INLYTA. Trate el hipotiroidismo y el hipertiroidismo según la práctica médica habitual para mantener el estado eutiroideo.

8.8 Deterioro en la Cicatrización de Heridas

Puede ocurrir deterioro en la cicatrización de heridas en pacientes que reciben medicamentos que inhiben la vía de señalización del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, INLYTA tiene el potencial de afectar de manera adversa la cicatrización de heridas.

Interrumpa el tratamiento con INLYTA por al menos 2 días antes de una cirugía electiva. No administre durante al menos 2 semanas luego de una cirugía mayor, y hasta que se produzca una cicatrización adecuada. Reanude INLYTA a una dosis reducida o suspenda según la gravedad y la persistencia del deterioro de la cicatrización de la herida. No se ha establecido la seguridad de la reanudación de INLYTA luego de la resolución de las complicaciones en la cicatrización de heridas [ver *Dosis y Administración (6.2)*].

8.9 Síndrome de Leucoencefalopatía Posterior Reversible

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, se informó el síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible (SLPR) en 1/359 pacientes ($<1\%$) que recibieron INLYTA y en ninguno de los pacientes que recibieron sorafenib [ver *Reacciones Adversas (9.1)*]. Hubo dos informes adicionales de SLPR en otros ensayos clínicos con INLYTA.

El SLPR es un trastorno neurológico que puede presentarse con dolor de cabeza, convulsiones, letargo, confusión, ceguera y otros trastornos visuales y neurológicos. Puede haber hipertensión de leve a grave. Es necesario realizar una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico de SLPR. Suspenda permanentemente INLYTA en pacientes que desarrollen SLPR. Se desconoce la seguridad de la reiniciación del tratamiento con INLYTA en pacientes que han experimentado previamente SLPR [ver *Dosis y Administración (6.2)*].

8.10 Proteinuria

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, se informó proteinuria en 39/359 pacientes (11%) que recibieron INLYTA y 26/355 pacientes (7%) que recibieron sorafenib. Se informó proteinuria de Grado 3 en 11/359 pacientes (3%) que recibieron INLYTA y 6/355 pacientes (2%) que recibieron sorafenib [ver *Reacciones Adversas (9.1)*].

Se recomienda monitorear la proteinuria antes de iniciar, y periódicamente durante el tratamiento con INLYTA. Para los pacientes que desarrollen proteinuria de moderada a severa, suspenda y luego reduzca la dosis de INLYTA [ver *Dosis y Administración (6.2)*].

8.11 Hepatotoxicidad

INLYTA como Agente Único

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de los pacientes con CCR, se informó elevación de alanina aminotransferasa (ALT) de todos los grados en el 22% de los pacientes en ambos grupos, con eventos de Grado 3/4 en $<1\%$ de los pacientes en el grupo de INLYTA. Cuando se utilice como

agente único, monitoree la ALT, aspartato aminotransferasa (AST) y bilirrubina antes de iniciar y periódicamente durante el tratamiento con INLYTA.

8.12 Administración en Pacientes con Insuficiencia Hepática

La exposición sistémica a axitinib fue superior en los sujetos con insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh clase B) en comparación con sujetos con función hepática normal. Se recomienda una reducción de la dosis cuando se administre INLYTA a pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh clase B). INLYTA no ha sido estudiado en pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh clase C) [ver *Dosis y Administración (6.2)*, *Uso en Poblaciones Específicas (11.6)* y *Farmacología Clínica (13.3)*].

8.13 Toxicidad Embriofetal

Con base en su mecanismo de acción y en hallazgos en estudios en animales, INLYTA puede causar daño fetal cuando se administra a mujeres embarazadas. No existen datos disponibles en seres humanos que informen del riesgo asociado al medicamento. En el desarrollo de estudios de toxicidad en ratones, axitinib fue teratogénico, embriotóxico y fetotóxico en la exposición materna que fueron inferiores a la exposición humana en la dosis clínica recomendada. Se debe advertir a mujeres en edad fértil sobre el potencial riesgo para el feto y acerca de usar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con INLYTA y por 1 semana después de la última dosis. Se debe advertir a los hombres con parejas mujeres en edad fértil sobre utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con INLYTA y por 1 semana después de la última dosis [ver *Uso en Poblaciones Específicas (11.1, 11.3)*, *Farmacología Clínica (13.1)*].

9. REACCIONES ADVERSAS

Las siguientes reacciones adversas de importancia clínica se discuten en otros lugares del inserto [ver *Advertencias y Precauciones (8)*]:

- Hipertensión [ver *Advertencias y Precauciones (8.1)*].
- Eventos tromboembólicos arteriales [ver *Advertencias y Precauciones (8.2)*].
- Eventos tromboembólicos venosos [ver *Advertencias y Precauciones (8.3)*].
- Hemorragia [ver *Advertencias y Precauciones (8.4)*].
- Insuficiencia cardíaca [ver *Advertencias y Precauciones (8.5)*].
- Perforación gastrointestinal y formación de fístula [ver *Advertencias y Precauciones (8.6)*].
- Disfunción tiroidea [ver *Advertencias y Precauciones (8.7)*].
- Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible [ver *Advertencias y Precauciones (8.9)*].
- Proteinuria [ver *Advertencias y Precauciones (8.10)*].
- Hepatotoxicidad [ver *Advertencias y Precauciones (8.11)*].
- Insuficiencia hepática [ver *Advertencias y Precauciones (8.12)*].

9.1 Experiencia en Ensayos Clínicos

Debido a que los ensayos clínicos se llevan a cabo en condiciones muy variables, no pueden compararse directamente las tasas de reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos de un fármaco con las tasas en los ensayos clínicos de otro medicamento y pueden no reflejar los índices observados en la práctica clínica.

Se ha evaluado la seguridad de INLYTA en 715 pacientes en estudios de monoterapia de segunda línea, que incluyeron 537 pacientes con CCR avanzado. Los datos descritos [ver *Reacciones Adversas (9.1)*] reflejan la exposición a INLYTA en 359 pacientes con CCR avanzado que participaron en un estudio clínico aleatorio frente a sorafenib.

La mediana de duración del tratamiento fue de 6,4 meses (rango 0,03 a 22,0) para los pacientes que recibieron INLYTA y 5,0 meses (rango 0,03 a 20,1) para los pacientes que recibieron sorafenib. Se produjeron modificaciones de la dosis o el retraso temporal del tratamiento debido a una reacción adversa en 199/359 pacientes (55%) que recibieron INLYTA y 220/355 pacientes (62%) que recibieron sorafenib. Se produjo una interrupción permanente debido a una reacción adversa en 34/359 pacientes (9%) que recibieron INLYTA y 46/355 pacientes (13%) que recibieron sorafenib.

Las reacciones adversas más frecuentemente observadas ($\geq 20\%$), tras el tratamiento con INLYTA fueron diarrea, hipertensión, fatiga, disminución del apetito, náuseas, disfonía, síndrome de eritrodismestesia palmo-plantar (manos y pies), pérdida de peso, vómitos, astenia y estreñimiento. La Tabla 3 presenta las reacciones adversas notificadas en $\geq 10\%$ de los pacientes que recibieron INLYTA o sorafenib.

Tabla 3. Reacciones Adversas que Ocurrieron en $\geq 10\%$ de los Pacientes que Recibieron INLYTA o Sorafenib

Reacciones Adversas ^a	INLYTA		Sorafenib	
	(N = 359)		(N = 355)	
	Todos los Grados ^b	Grado 3/4	Todos los Grados ^b	Grado 3/4
	%	%	%	%
Diarrea	55	11	53	7
Hipertensión	40	16	29	11
Fatiga	39	11	32	5
Disminución del apetito	34	5	29	4
Náuseas	32	3	22	1
Disfonía	31	0	14	0
Síndrome de eritrodismestesia palmo-plantar	27	5	51	16
Pérdida de peso	25	2	21	1
Vómitos	24	3	17	1
Astenia	21	5	14	3
Estreñimiento	20	1	20	1
Hipotiroidismo	19	<1	8	0
Tos	15	1	17	1
Inflamación de la mucosa	15	1	12	1
Artralgia	15	2	11	1
Estomatitis	15	1	12	<1
Disnea	15	3	12	3
Dolor abdominal	14	2	11	1
Dolor de cabeza	14	1	11	0
Dolor en las extremidades	13	1	14	1
Erupción	13	<1	32	4
Proteinuria	11	3	7	2
Disgeusia	11	0	8	0
Piel seca	10	0	11	0
Dispepsia	10	0	2	0
Prurito	7	0	12	0
Alopecia	4	0	32	0
Eritema	2	0	10	<1

^a Los porcentajes son emergentes del tratamiento, eventos por toda causa.

^b Criterios de Terminología Común del Instituto Nacional del Cáncer para Eventos Adversos, Versión 3.0.

Las reacciones adversas seleccionadas (todos los grados) que se informaron en $< 10\%$ de los pacientes tratados con INLYTA incluyeron mareos (9%), dolor abdominal superior (8%), mialgia (7%), deshidratación (6%), epistaxis (6%), anemia (4%), hemorroides (4%), hematuria (3%), tinnitus (3%), aumento de la lipasa (3%), glosodinia (3%), embolia pulmonar (2%), hemorragia rectal (2%), hemoptisis (2%), trombosis venosa profunda (1%), trombosis/oclusión venosa de la retina (1%), policitemia (1%) y ataque isquémico transitorio (1%).

La Tabla 4 presenta las anormalidades de laboratorio más comunes informadas en $\geq 10\%$ de los pacientes que recibieron INLYTA o sorafenib.

Tabla 4. Anormalidades de Laboratorio que se Producen en $\geq 10\%$ de los Pacientes que Recibieron INLYTA o Sorafenib

Anormalidad de Laboratorio	N	INLYTA	N	Sorafenib
----------------------------	---	--------	---	-----------

		Todos los Grados ^a	Grado 3/4		Todos los Grados ^a	Grado 3/4
		%	%		%	%
Hematología						
Disminución de la hemoglobina	320	35	<1	316	52	4
Disminución de linfocitos (absoluto)	317	33	3	309	36	4
Disminución de plaquetas	312	15	<1	310	14	0
Disminución de glóbulos blancos	320	11	0	315	16	<1
Química						
Aumento de creatinina	336	55	0	318	41	<1
Bicarbonato disminuido	314	44	<1	291	43	0
Hipocalcemia	336	39	1	319	59	2
ALP aumentado	336	30	1	319	34	1
Hiper glucemia	336	28	2	319	23	2
Aumento de lipasa	338	27	5	319	46	15
Aumento de amilasa	338	25	2	319	33	2
Aumento de ALT	331	22	<1	313	22	2
Aumento de AST	331	20	<1	311	25	1
Hipernatremia	338	17	1	319	13	1
Hipoalbuminemia	337	15	<1	319	18	1
Hiperpotasemia	333	15	3	314	10	3
Hipoglucemia	336	11	<1	319	8	<1
Hiponatremia	338	13	4	319	11	2
Hipofosfatemia	336	13	2	318	49	16

^a Criterios de Terminología Común del Instituto Nacional del Cáncer para Eventos Adversos, Versión 3.0.
ALP: fosfatasa alcalina, ALT: alanina aminotransferasa, AST: aspartato aminotransferasa.

La selección de anomalías de laboratorio (todos los grados) que se informaron en <10% de los pacientes tratados con INLYTA incluyeron el aumento de hemoglobina (por encima del límite superior normal) (9% para INLYTA en comparación con 1% de sorafenib) e hipercalcemia (6% para INLYTA en comparación con 2% para sorafenib).

9.2 Experiencia Poscomercialización

Se han identificado las siguientes reacciones adversas durante la administración posterior a la aprobación de INLYTA. Debido a que estas reacciones se informan de manera voluntaria por parte de una población de tamaño incierto, no siempre es posible calcular de manera confiable su frecuencia, o establecer una relación causal con la exposición al medicamento.

Trastornos vasculares: arteriales (incluidos de la aorta), aneurismas, disecciones y ruptura.

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del producto. Se invita a los profesionales de la salud a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del sistema de farmacovigilancia. Puede informar al correo PER.AEReporting@pfizer.com, llamar al teléfono (+511) 6152100 ext. 2117.

10. INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

10.1 Inhibidores del CYP3A4/5

La coadministración de ketoconazol, un fuerte inhibidor de CYP3A4/5, aumentó la exposición plasmática de axitinib en voluntarios sanos. Se debe evitar la administración conjunta de INLYTA con inhibidores potentes de CYP3A4/5. La toronja o jugo de toronja también pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de axitinib y debe evitarse. Se recomienda la selección de medicación concomitante con un nulo o mínimo potencial de inhibición del CYP3A4/5. Si un inhibidor potente de CYP3A4/5 debe ser coadministrado, se debe reducir la dosis de INLYTA [ver *Dosis y Administración (6.2)* y *Farmacología Clínica (13.3)*].

10.2 Inductores del CYP3A4/5

La administración conjunta de rifampicina, un fuerte inductor de CYP3A4/5, reduce la exposición plasmática de axitinib en voluntarios sanos. Debe evitarse la administración conjunta de INLYTA con inductores potentes de CYP3A4/5 (por ejemplo, rifampicina, dexametasona, fenitoína, carbamazepina, rifabutina, rifapentina, fenobarbital y hierba de San Juan). Se recomienda la selección de medicamentos concomitantes con un nulo o mínimo potencial de inducción de CYP3A4/5 [ver Dosis y Administración (6.2), Farmacología Clínica (13.3)]. Si es posible se deben evitar los inductores moderados del CYP3A4/5 (por ejemplo, bosentán, efavirenz, etravirina, modafinilo y nafcilina) que también pueden reducir la exposición al plasma de axitinib.

11. USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

11.1 Embarazo

Resumen de Riesgos

Con base en hallazgos en estudios en animales y su mecanismo de acción, INLYTA puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada. No existen datos disponibles en seres humanos que informen el riesgo asociado al medicamento. En estudios de toxicidad del desarrollo, axitinib resultó ser teratogénico, embriotóxico y fetotóxico en ratones a exposiciones menores que las de los seres humanos con la dosis inicial recomendada (ver Datos). Se debe aconsejar a mujeres con capacidad reproductiva con respecto al posible riesgo para el feto.

El riesgo asociado de defectos de nacimiento importantes y de aborto espontáneo para las poblaciones indicadas se desconoce. Sin embargo, el riesgo asociado en la población general de los Estados Unidos (EE. UU.) para defectos de nacimiento importantes es de 2% a 4% y para el aborto espontáneo es de 15% a 20% en embarazos reconocidos clínicamente.

Datos

Datos en animales

Axitinib oral administrado dos veces al día a ratones hembra antes del apareamiento y durante la primera semana de preñez provocó un aumento en la pérdida posterior a la implantación en todas las dosis probadas (≥ 15 mg/kg/dosis, aproximadamente 10 veces la exposición sistémica (ABC) en pacientes a la dosis de inicio recomendada). En un estudio de toxicidad del desarrollo embrionario, las ratonas preñadas recibieron dosis orales de 0,15, 0,5 y 1,5 mg/kg/dosis dos veces al día de axitinib durante el período de organogénesis. Las toxicidades embriofetales observadas en ausencia de toxicidad materna incluyeron malformación (paladar hendido) a 1,5 mg/kg/dosis (aproximadamente 0,5 veces el ABC en pacientes con la dosis inicial recomendada) y la variación en la osificación esquelética a $\geq 0,5$ mg/kg/dosis (aproximadamente 0,15 veces el ABC en pacientes con la dosis inicial recomendada).

11.2 Lactancia

Resumen de Riesgos

No existen datos sobre la presencia de axitinib en la leche humana, ni de sus efectos en niños amamantados o en la producción de leche. Debido al potencial de reacciones adversas serias en un niño amamantado por el consumo de INLYTA, se debe aconsejar a las madres lactantes no amamantar durante el tratamiento y durante 2 semanas luego de consumir la última dosis.

11.3 Mujeres y Hombres con Capacidad Reproductiva

Con base en hallazgos en estudios en animales, INLYTA puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada [ver Uso en poblaciones específicas (11.1)].

Prueba de Embarazo

Verificar el estado de embarazo en mujeres con capacidad reproductiva antes de comenzar el tratamiento con INLYTA.

Anticoncepción

Mujeres

Se debe aconsejar a las mujeres con potencial reproductivo que empleen métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con INLYTA y durante 1 semana después de la última dosis.

Hombres

Con base en hallazgos en estudios en animales, se debe aconsejar a los hombres con parejas mujeres con potencial reproductivo que utilicen métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y por 1 semana después de la última dosis.

Infertilidad

Mujeres y Hombres

Con base en hallazgos en animales, INLYTA puede deteriorar la fertilidad en mujeres y hombres con capacidad reproductiva [ver *Toxicología No clínica (14.1)*].

11.4 Uso Pediátrico

No se ha establecido la seguridad y efectividad de INLYTA en pacientes pediátricos.

La seguridad y la efectividad de INLYTA se evaluaron, pero no se establecieron, en dos estudios abiertos: un estudio de búsqueda de dosis de INLYTA en monoterapia en 17 pacientes pediátricos de 5 a <17 años con tumores sólidos recurrentes o resistentes al tratamiento (ADV1315, NCT02164838) y un estudio aleatorizado de INLYTA en monoterapia o en combinación en 7 pacientes pediátricos de 7 a <17 años (AREN1721, NCT035951224).

No se observaron nuevas señales de seguridad con INLYTA en pacientes pediátricos en estos estudios.

La exposición en pacientes pediátricos que recibieron INLYTA a la dosis máxima tolerada fue inferior a la observada previamente en adultos que recibieron la dosis inicial recomendada aprobada.

Datos de Toxicidad en Animales Jóvenes

Se observó toxicidad en los huesos y los dientes en ratones y perros inmaduros administrados con axitinib por vía oral dos veces al día durante 1 mes o más. Los efectos en los huesos consisten en placas de crecimiento engrosadas en ratones y perros a ≥ 15 mg/kg/dosis (aproximadamente 6 y 15 veces, respectivamente, la exposición sistémica (ABC) en pacientes a la dosis inicial recomendada). Se observaron anomalías en el crecimiento de los dientes incisivos (incluyendo caries dentales, mal oclusiones y dientes rotos y/o faltantes) en ratones administrados con axitinib por vía oral dos veces al día a ≥ 5 mg/kg/dosis (aproximadamente 1,5 veces el ABC en pacientes a la dosis inicial recomendada). No se han evaluado otras toxicidades de interés potencial para los pacientes pediátricos en animales juveniles.

11.5 Uso Geriátrico

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, 123/359 pacientes (34%) tratados con INLYTA tenían ≥ 65 años. A pesar de que no se puede descartar una mayor sensibilidad en algunos individuos mayores de esa edad, no se observaron diferencias globales en la seguridad y la eficacia de INLYTA entre los pacientes de ≥ 65 años y menores.

No es necesario ajustar la dosis en pacientes de edad avanzada [ver *Dosis y Administración (6.2)* y *Farmacología Clínica (13.3)*].

11.6 Insuficiencia Hepática

En un ensayo dedicado a la insuficiencia hepática, en comparación con sujetos con función hepática normal, la exposición sistémica después de una dosis única de INLYTA fue similar en sujetos con insuficiencia hepática leve basal (Child-Pugh clase A) y superior en los sujetos con insuficiencia hepática basal moderada (Child-Pugh clase B).

No es necesario ajustar la dosis inicial para la administración de INLYTA a pacientes con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh clase A). Se recomienda una reducción de la dosis inicial cuando se administra INLYTA a pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh clase B) [ver *Dosis y Administración* (6.2), *Advertencias y Precauciones* (8.12) y *Farmacología Clínica* (13.3)].

No se ha estudiado INLYTA en pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh clase C).

11.7 Insuficiencia Renal

No se ha llevado a cabo ningún ensayo dedicado a la insuficiencia renal para axitinib. En base a los análisis farmacocinéticos poblacionales, no se observó diferencia significativa en el aclaramiento de axitinib en pacientes con antecedentes de insuficiencia renal leve a grave ($15 \text{ mL/min} \leq \text{aclaramiento de creatinina [CLcr]} < 89 \text{ mL/min}$) [ver *Farmacología Clínica* (13.3)]. No es necesario ajustar la dosis inicial para los pacientes con antecedentes de insuficiencia renal leve a severa. Se debe tener precaución en pacientes con enfermedad renal terminal ($\text{CLcr} < 15 \text{ mL/min}$).

12. SOBREDOSIS

No existe un tratamiento específico para la sobredosis de INLYTA.

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de los pacientes con CCR, un paciente recibió de forma inadvertida una dosis de 20 mg dos veces al día durante 4 días y experimentó mareos (Grado 1).

En un estudio clínico de búsqueda de dosis con INLYTA, los pacientes que recibieron dosis de inicio de 10 mg dos veces al día o 20 mg dos veces al día experimentaron reacciones adversas que incluyeron hipertensión, convulsiones asociadas con la hipertensión y hemoptisis mortal.

En casos de sospecha de sobredosis, INLYTA debe suspenderse y deben instaurarse cuidados de apoyo.

13. FARMACOLOGÍA CLÍNICA

13.1 Mecanismo de acción

Se ha demostrado que axitinib inhibe los receptores de la tirosina quinasa, incluidos los receptores del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGFR)-1, VEGFR-2 y VEGFR-3 a concentraciones plasmáticas terapéuticas. Estos receptores están implicados en la angiogénesis patológica, el crecimiento del tumor y la progresión del cáncer. La proliferación y supervivencia celular de las células endoteliales mediada por VEGF fueron inhibidas por axitinib *in vitro* y en modelos de ratón. Axitinib ha demostrado inhibir el crecimiento del tumor y la fosforilación de VEGFR-2 en modelos de xenoinjerto de tumor en ratón.

13.2 Farmacodinamia

Se evaluó el efecto de una dosis oral única de INLYTA (5 mg) en ausencia y en presencia de 400 mg ketoconazol en el intervalo QTc en un estudio aleatorio, simple ciego, cruzado, de dos vías en 35 pacientes sanos. No hay grandes cambios en el intervalo QTc medio (es decir, $>20 \text{ ms}$) desde que se detectó placebo hasta 3 horas después de la dosis. Sin embargo, no se pueden descartar pequeños aumentos en el intervalo QTc medio (es decir, $<10 \text{ ms}$).

13.3 Farmacocinética

El análisis farmacocinético poblacional combina datos de 17 ensayos en sujetos sanos y en pacientes con cáncer. Un modelo de disposición de dos compartimentos con absorción de primer orden y retardo de tiempo describe adecuadamente el perfil concentración-tiempo de axitinib.

Absorción y Distribución

Después de una administración oral única de una dosis de 5 mg, la mediana de $T_{\text{máx}}$ varió de 2,5 a 4,1 horas. Sobre la base de la semivida plasmática, se espera el estado estacionario dentro de 2 a 3 días de dosificación. La dosificación de axitinib de 5 mg dos veces al día resultó en una acumulación aproximadamente 1,4 veces en comparación con la administración de una dosis única. En estado de equilibrio, axitinib presenta aproximadamente una farmacocinética lineal dentro del rango de dosis de 1 mg a 20 mg. La biodisponibilidad absoluta media de axitinib después de una dosis oral de 5 mg es del 58%.

En comparación con el ayuno durante la noche, la administración de INLYTA con una comida moderada en grasas dio lugar a una ABC 10% inferior y una comida rica en grasas, alta en calorías, resultó en una ABC 19% superior. INLYTA puede administrarse con o sin alimentos [*ver Dosis y Administración (6.1)*].

Axitinib tiene una alta unión (>99%) a las proteínas plasmáticas humanas con unión preferencial a la albúmina y una unión moderada a un ácido glicoproteico- α_1 . En los pacientes con CCR avanzado (n=20), a la dosis de 5 mg dos veces al día en el estado alimentado, la media geométrica (% CV) $C_{\text{máx}}$ y ABC₀₋₂₄ fueron 27,8 (79%) ng/mL y 265 (77%) ng.h/mL, respectivamente. La media geométrica (% CV) de aclaramiento y volumen de distribución aparente fueron 38 (80%) L/h y 160 (105%) L, respectivamente.

Metabolismo y Eliminación

La semivida plasmática de INLYTA oscila desde 2,5 hasta 6,1 horas. Axitinib se metaboliza principalmente en el hígado por el CYP3A4/5 y en menor medida por el CYP1A2, CYP2C19 y UGT1A1. Después de la administración oral de una dosis de 5 mg de axitinib radioactivo, aproximadamente el 41% de la radioactividad se recuperó en las heces y aproximadamente el 23% se recuperó en orina. El axitinib inalterado, que representa el 12% de la dosis, fue el componente principal identificado en heces. No se detectó axitinib inalterado en la orina, los metabolitos de ácido carboxílico y sulfóxido representaron la mayor parte de la radiactividad en la orina. En el plasma, el metabolito N-glucurónido representa el componente radioactivo predominante (50% de la radiactividad circulante) y axitinib inalterado y el metabolito sulfóxido, cada uno representaron aproximadamente el 20% de la radioactividad circulante.


Los metabolitos sulfóxido y N-glucurónido muestran aproximadamente ≥ 400 veces menos potencia *in vitro* contra VEGFR-2 en comparación con axitinib.

Interacciones con Otros Medicamentos

Efectos de Otros Medicamentos sobre INLYTA

El axitinib es metabolizado principalmente en el hígado por el CYP3A4/5. Además, la solubilidad acuosa de axitinib es dependiente del pH, con un pH más alto que resulta en una menor solubilidad. Los efectos de un inhibidor fuerte CYP3A4/5, un potente inductor del CYP3A4/5, y un antiácido sobre la farmacocinética de axitinib se presentan en la Figura 1 [*ver Dosis y Administración (6.2) e Interacciones Farmacológicas (10.1, 10.2)*].

Figura 1. Impacto de los Medicamentos Administrados Conjuntamente e Insuficiencia Hepática sobre la Farmacocinética de Axitinib



ABC: área bajo la curva; C_{máx}: concentración máxima. *Ver Dosis y Administración (6)

Efectos de INLYTA sobre Otros Medicamentos

Los estudios *in vitro* demostraron que axitinib tiene el potencial para inhibir el CYP1A2 y CYP2C8. Sin embargo, la coadministración de axitinib con paclitaxel, un sustrato de CYP2C8, no aumentó las concentraciones plasmáticas de paclitaxel en los pacientes.

Los estudios *in vitro* indicaron que axitinib no inhibe el CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4/5 o UGT1A1 a concentraciones plasmáticas terapéuticas. En estudios *in vitro* en hepatocitos humanos indicó que axitinib no induce CYP1A1, CYP1A2 o CYP3A4/5.

Axitinib es un inhibidor del transportador de eflujo de P-glicoproteína (*P-gp*) *in vitro*. Sin embargo, no se espera que INLYTA inhiba la *P-gp* a concentraciones plasmáticas terapéuticas.

Poblaciones Específicas

Pacientes con Insuficiencia Hepática

Los efectos de la insuficiencia hepática sobre la farmacocinética de axitinib se presentan en la Figura 1 [ver Dosis y Administración (6.2), Advertencias y Precauciones (8.12) y Uso en Poblaciones Específicas (11.6)].

Pacientes con Insuficiencia Renal

El análisis farmacocinético poblacional (según la función renal preexistente) se llevó a cabo en 590 voluntarios sanos y pacientes, cinco de ellos con insuficiencia renal grave (15 mL/min ≤ CL_{cr} <29 mL/min), 64 con insuficiencia renal moderada (30 mL/min ≤ CL_{cr} <59 mL/min), y 139 con insuficiencia renal leve (60 mL/min ≤ CL_{cr} <89 mL/min). La insuficiencia renal leve a grave no tuvo efectos

significativos sobre la farmacocinética de axitinib. Están disponibles los datos de un solo paciente con enfermedad renal en etapa terminal [ver *Uso en Poblaciones Específicas (11.7)*].

Otros Factores Intrínsecos

Los análisis farmacocinéticos poblacionales indican que no hay efectos clínicamente relevantes de la edad, género, raza, peso, superficie corporal, genotipo UGT1A1, o CYP2C19 sobre el aclaramiento de axitinib.

14. TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

14.1 Carcinogénesis, Mutagénesis, Deterioro de la Fertilidad

No se han realizado estudios de carcinogenicidad con axitinib.

El axitinib no fue mutagénico en un ensayo de mutación reversa bacteriana *in vitro* (Ames) y no fue clastogénico en el ensayo de aberración cromosómica de linfocitos humanos *in vitro*. El axitinib fue genotóxico en el ensayo de micronúcleo de médula ósea de ratón *in vivo*.

INLYTA tiene el potencial de perjudicar la función reproductiva y la fertilidad en los seres humanos. En los estudios de toxicología de dosis repetidas, se observaron hallazgos en el tracto reproductivo masculino en los testículos/epidídimo (disminución del peso del órgano, atrofia o degeneración, disminución del número de células germinales, hipospermia o formas anormales del espermatozoide, reducción de la densidad espermática y conteo) a ≥ 15 mg/kg/dosis administrada oralmente dos veces al día en ratones (aproximadamente 7 veces la exposición sistémica (ABC) en pacientes a la dosis inicial recomendada) y $\geq 1,5$ mg/kg/dosis administrada por vía oral dos veces al día en perros (aproximadamente 0,1 veces el ABC en pacientes a la dosis inicial recomendada). Los hallazgos en el tracto reproductivo femenino en ratones y perros incluyeron signos de madurez sexual retrasada, cuerpos lúteos reducidos o ausentes, pesos uterinos disminuidos y atrofia uterina a ≥ 5 mg/kg/dosis (aproximadamente 1,5 o 0,3 veces el ABC en pacientes con la dosis inicial recomendada en comparación con ratones y perros, respectivamente).

En un estudio de fertilidad en ratones, el axitinib no afectó la tasa de apareamiento o fertilidad cuando se administró por vía oral dos veces al día a los machos en cualquier dosis ensayada hasta 50 mg/kg/dosis después de al menos 70 días de administración (aproximadamente 57 veces el ABC en pacientes en la dosis inicial recomendada). En ratones hembra, se observó una fertilidad reducida y una viabilidad embrionaria a todas las dosis ensayadas (≥ 15 mg/kg/dosis administradas oralmente dos veces al día) después de al menos 15 días de tratamiento con axitinib (aproximadamente 10 veces el ABC en pacientes a la dosis inicial recomendada).

15. DATOS FARMACÉUTICOS

15.1 Lista de excipientes

Celulosa microcristalina, Lactosa monohidrato, Croscarmelosa de sodio, Estearato de magnesio, Opadry II Rojo 32K15441*, Agua purificada.

*Lactosa monohidrato, Hidroxipropilmetilcelulosa/Hipromelosa, Dióxido de titanio, Triacetin (triacetato de glicerol), Óxido de hierro rojo.

15.2 Incompatibilidades

No procede.

15.3 Tiempo de vida útil

No sobrepasar la fecha de vencimiento indicada en el empaque.

15.4 Precauciones especiales de conservación

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el empaque.

15.5 Naturaleza y contenido del envase

INLYTA 1 mg Tabletas recubiertas

Caja de cartón conteniendo un frasco de polietileno de alta densidad color blanco con tapa de polipropileno blanco con 180 tabletas recubiertas.

INLYTA 5 mg Tabletas recubiertas

Caja de cartón conteniendo un frasco de polietileno de alta densidad blanco con tapa de polipropileno blanco con 60 tabletas recubiertas.

15.6 Precauciones especiales de eliminación

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local.

Fecha de Revisión: Octubre2024

LLD_Per_USPI_LAB-0561-8.0_19Jul2024_v1