

▼ Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de nova informação de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas. Para saber como notificar reações adversas, ver secção 4.8.

1. NOME DO MEDICAMENTO

CRESEMBA 100 mg cápsulas

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

Cada cápsula contém 100 mg de isavuconazol (sob a forma de 186,3 mg de sulfato de isavuconazônio).

3. FORMA FARMACÊUTICA

Cápsula rígida

Corpo da cápsula em cor de laranja sueco (castanho avermelhado) marcado com "100" em tinta preta, e cabeça branca marcada com "C" em tinta preta. Comprimento das cápsulas: 24,2 mm.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

CRESEMBA é indicado para adultos, para o tratamento de

- aspergilose invasiva
- mucormicose em doentes para os quais a anfotericina B não é adequada (ver secções 4.4 e 5.1)

Deve ser tida em consideração a orientação oficial relativa ao uso apropriado de agentes antifúngicos.

4.2 Posologia e modo de administração

Posologia

Dose de carga

A dose de carga recomendada é duas cápsulas (equivalente a 200 mg de isavuconazol) de em 8 horas, durante as primeiras 48 horas (6 administrações no total).

Dose de manutenção

A dose de manutenção recomendada é duas cápsulas (equivalente a 200 mg de isavuconazol) uma vez por dia, começando 12 a 24 horas após a última dose de carga.

A duração da terapia deve ser determinada pela resposta clínica (ver secção 5.1).

Para o tratamento de longo prazo, com duração superior a 6 meses, a relação risco-benefício deve ser cuidadosamente ponderada (ver secções 5.1 e 5.3).

Mudança para perfusão intravenosa

CRESEMBA também está disponível sob a forma de pó para concentrado para solução para perfusão contendo 200 mg de isavuconazol, o equivalente a 372 mg de sulfato de isavuconazónio.

Com base na elevada biodisponibilidade oral (98%, ver secção 5.2), a mudança da administração intravenosa para a administração oral é apropriada quando for clinicamente indicada.

Idosos

Não é necessário qualquer ajuste da dose para doentes idosos; contudo, a experiência clínica em doentes idosos é limitada.

Compromisso renal

Não é necessário qualquer ajuste da dose para doentes com compromisso renal, incluindo doentes com doença renal em fase terminal (ver secção 5.2).

Compromisso hepático

Não é necessário qualquer ajuste da dose para doentes com compromisso renal ligeiro ou moderado (Child-Pugh Classes A e B) (ver secções 4.4 e 5.2).

CRESEMBA não foi estudado em doentes com compromisso hepático grave (Child-Pugh Classe C). A utilização nestes doentes não é recomendada, a menos que se considere que os potenciais benefícios prevaleçam sobre os riscos. Ver secções 4.4, 4.8 e 5.2.

População pediátrica

A segurança e eficácia de CRESEMBA em crianças com menos de 18 anos de idade não foram ainda estabelecidas. Não existem dados disponíveis.

Modo de administração

CRESEMBA cápsulas pode ser tomado com ou sem alimentos.

CRESEMBA cápsulas deve ser tomado inteiro. Não mastigue, esmague, dissolva ou abra as cápsulas.

4.3 Contraindicações

Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1.

Administração concomitante com cetoconazol (ver secção 4.5).

Administração concomitante com dose elevada de ritonavir (>200 mg a cada 12 horas) (ver secção 4.5).

Administração concomitante com indutores fortes do CYP3A4/5, como a rifampicina, rifabutina, carbamazepina, barbitúricos de ação prolongada (por ex., fenobarbital), fenitoína e hipericão, ou com indutores moderados do CYP3A4/5, como o efavirenz, nafcilina e etravirina (ver secção 4.5).

Doentes com síndrome do QT curto familiar (ver secção 4.4).

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

Hipersensibilidade

Devem ser tomadas precauções ao prescrever isavuconazol a doentes com hipersensibilidade a outros agentes antifúngicos azólicos. A hipersensibilidade ao isavuconazol pode resultar em reações adversas, tais como: hipotensão, falência respiratória, dispneia, erupção medicamentosa, prurido e erupção cutânea.

Reações adversas cutâneas graves

Durante o tratamento com agentes antifúngicos azólicos foram comunicadas reações adversas cutâneas graves, tais como a síndrome de Stevens-Johnson. Se um doente desenvolver uma reação cutânea grave, a administração de CRESEMBA deve ser interrompida.

Cardiovascular

Encurtamento do intervalo QT

CRESEMBA está contraindicado em doentes com síndrome do QT curto familiar (ver secção 4.3).

Num estudo do intervalo QT em indivíduos saudáveis, o isavuconazol encurtava o intervalo QTc de forma relacionada com a concentração. Para o regime de dosagem de 200 mg, a diferença da média dos mínimos quadrados (MMQ) em relação ao placebo foi de 13,1 ms 2 horas após a dose [IC 90%: 17,1; 9,1 ms]. O aumento da dose para 600 mg resultou numa diferença da MMQ em relação ao placebo de 24,6 ms 2 horas após a dose [IC 90%: 28,7; 20,4 ms].

É necessário ter cuidado ao prescrever CRESEMBA a doentes que tomem outros medicamentos que se saiba diminuírem o intervalo QT, como a rufinamida.

Transaminases hepáticas elevadas ou hepatite

Foram comunicadas transaminases hepáticas elevadas em estudos clínicos (ver secção 4.8). As elevações das transaminases hepáticas raramente exigiram a interrupção do tratamento com CRESEMBA. A monitorização das enzimas hepáticas deve ser considerada, como clinicamente indicada. Foram notificados casos de hepatite com agentes antifúngicos da classe dos azóis incluindo CRESEMBA.

Compromisso hepático grave

CRESEMBA não foi estudado em doentes com compromisso hepático grave (Child-Pugh Classe C). A utilização nestes doentes não é recomendada, a menos que se considere que os potenciais benefícios prevaleçam sobre os riscos. A potencial toxicidade do medicamento deve ser cuidadosamente monitorizada nestes doentes. Ver secções 4.2, 4.8 e 5.2.

Utilização concomitante com outros medicamentos

Inibidores do CYP3A4/5

O cetoconazol está contraindicado (ver secção 4.3). Relativamente ao inibidor forte do CYP3A4 lopinavir/ritonavir, foi observado um aumento de duas vezes na exposição ao isavuconazol. Relativamente a outros inibidores fortes do CYP3A4/5, pode ser esperado um efeito menos pronunciado. Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA quando administrado concomitantemente com inibidores fortes do CYP3A4/5, contudo recomenda-se precaução, pois podem aumentar as reações adversas aos medicamentos (ver secção 4.5.).

Indutores do CYP3A4/5

A administração concomitante com indutores ligeiros do CYP3A4/5, tais como o aprepitant, a prednisona e a pioglitazona, pode resultar em diminuições ligeiras a moderadas dos níveis plasmáticos do isavuconazol; a administração concomitante com indutores ligeiros do CYP3A4/5 deve ser evitada, a menos que se considere que os potenciais benefícios prevalecem sobre os riscos (ver secção 4.5).

Substratos do CYP3A4/5 incluindo imunossuppressores

O isavuconazol pode ser considerado um inibidor moderado do CYP3A4/5, e a exposição sistémica a medicamentos metabolizados pelo CYP3A4 pode ser aumentada aquando da administração concomitante com CRESEMBA. A utilização concomitante de CRESEMBA com substratos do CYP3A4, tais como os imunossuppressores tacrolímus, sirolímus ou ciclosporina pode aumentar a exposição sistémica a estes medicamentos. Poderá ser necessário proceder à monitorização apropriada do medicamento terapêutico e ao ajuste da dose durante a administração concomitante (ver secção 4.5).

Substratos do CYP2B6

O isavuconazol é um indutor do CYP2B6. A exposição sistémica a medicamentos metabolizados pelo CYP2B6 pode ser reduzida aquando da administração concomitante com CRESEMBA. Por conseguinte, recomenda-se precaução quando forem administrados concomitantemente com CRESEMBA substratos do CYP2B6, especialmente medicamentos de índice terapêutico estreito como a ciclofosfamida. A utilização do substrato de CYP2B6 efavirenz com CRESEMBA é contraindicada porque o efavirenz é um indutor moderado do CYP3A4/5 (ver secção 4.3).

Substratos da P-gp

O isavuconazol pode aumentar a exposição de medicamentos que sejam substratos da P-gp. Pode ser necessário proceder ao ajuste da dose dos medicamentos substratos da P-gp, especialmente medicamentos com um índice terapêutico estreito como a digoxina, a colquicina e o dabigatranato etexilato, aquando da administração concomitante com CRESEMBA (ver secção 4.5).

Limitações dos dados clínicos

Os dados clínicos relativos ao isavuconazol no tratamento da mucormicose são limitados a um ensaio clínico prospetivo não controlado, realizado em 37 doentes com mucormicose

comprovada ou provável que receberam isavuconazol como tratamento primário ou porque o tratamento com outros antifúngicos (predominantemente a anfotericina B) não era apropriado. Para espécies de *Mucorales* individuais, os dados de eficácia clínica são muito limitados, muitas vezes a um ou dois doentes (ver secção 5.1). Dados de suscetibilidade estavam disponíveis em apenas um pequeno subconjunto de casos. Estes dados indicaram que as concentrações de isavuconazol necessárias para a inibição *in vitro* são muito variáveis entre géneros/espécies na ordem dos *Mucorales*, e geralmente mais elevadas do que as concentrações necessárias para inibir espécies de *Aspergillus*. É importante referir que não foi realizado nenhum estudo de determinação da dose na mucormicose; os doentes receberam uma dose de isavuconazol igual à utilizada no tratamento da aspergilose invasiva.

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação

Potencial de medicamentos afetarem a farmacocinética do isavuconazol

O isavuconazol é um substrato do CYP3A4 e do CYP3A5 (ver secção 5.2). A administração-concomitante de medicamentos inibidores do CYP3A4 e/ou do CYP3A5 pode aumentar as concentrações plasmáticas do isavuconazol. A administração concomitante de medicamentos indutores do CYP3A4 e/ou do CYP3A5 pode reduzir as concentrações plasmáticas do isavuconazol.

Medicamentos que inibem o CYP3A4/5

A administração concomitante de CRESEMBA com o inibidor forte do CYP3A4/5 cetoconazol, é contraindicada, uma vez que este medicamento pode aumentar significativamente as concentrações plasmáticas do isavuconazol (ver secções 4.3 e 4.5).

Relativamente ao inibidor forte do CYP3A4 lopinavir/ritonavir, foi observado um aumento de duas vezes na exposição ao isavuconazol. Para outros inibidores fortes do CYP3A4, como a claritromicina, o indinavir e o saquinavir, é de esperar um efeito menos pronunciado, com base na respetiva potência relativa. Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA quando administrado concomitantemente com inibidores fortes do CYP3A4/5, contudo recomenda-se precaução, pois podem aumentar as reações adversas aos medicamentos (ver secção 4.4).

Não se justifica qualquer ajuste da dose para os inibidores moderados a ligeiros do CYP3A4/5.

Medicamentos que induzem o CYP3A4/5

A administração concomitante de CRESEMBA com indutores potentes do CYP3A4/5, como a rifampicina, rifabutina, carbamazepina, barbitúricos de ação prolongada (por ex., fenobarbital), fenitoína e hipericão, ou com indutores moderados do CYP3A4/5, como o efavirenz, nafcilina e etravirina, é contraindicada, uma vez que estes medicamentos podem reduzir significativamente as concentrações plasmáticas do isavuconazol (ver secção 4.3).

A administração concomitante com indutores ligeiros do CYP3A4/5, tais como o aprepitant, a prednisona e a pioglitazona, pode resultar em diminuições ligeiras a moderadas dos níveis plasmáticos do isavuconazol; a administração-concomitante com indutores ligeiros do CYP3A4/5 deve ser evitada, a menos que se considere que os potenciais benefícios prevaleçam sobre os riscos (ver secção 4.4).

A administração concomitante com uma dose elevada de ritonavir (>200 mg, duas vezes por dia) é contraindicada, uma vez que as doses elevadas de ritonavir podem induzir o CYP3A4/5 e reduzir as concentrações plasmáticas do isavuconazol (ver secção 4.3).

Potencial do CRESEMBA afetar os níveis de exposição de outros medicamentos

Medicamentos metabolizados pelo CYP3A4/5

O isavuconazol é um inibidor moderado do CYP3A4/5; a administração concomitante de CRESEMBA com medicamentos substratos do CYP3A4/5 pode resultar no aumento das concentrações plasmáticas destes medicamentos.

Medicamentos metabolizados pelo CYP2B6

O isavuconazol é um indutor ligeiro do CYP2B6; a administração concomitante de CRESEMBA pode resultar na redução das concentrações plasmáticas dos substratos do CYP2B6.

Medicamentos transportados pela P-gp no intestino

O isavuconazol é um inibidor ligeiro da P-glicoproteína (P-gp); a administração concomitante com CRESEMBA pode resultar no aumento das concentrações plasmáticas dos substratos da P-gp.

Medicamentos transportados pela BCRP

O isavuconazol é um inibidor *in vitro* da BCRP, pelo que pode haver um aumento das concentrações plasmáticas dos substratos da BCRP. Recomenda-se precaução aquando da administração concomitante de CRESEMBA com substratos da BCRP.

Medicamentos excretados pelos rins através das proteínas de transporte

O isavuconazol é um inibidor ligeiro do transportador de catiões orgânicos 2 (OCT2). A administração concomitante de CRESEMBA com medicamentos substratos do OCT2 pode resultar no aumento das concentrações plasmáticas destes medicamentos.

Substratos da uridina difosfato glucuronosiltransferase (UGT)

O isavuconazol é um inibidor ligeiro da UGT. A administração concomitante de CRESEMBA com medicamentos substratos da UGT pode resultar no aumento ligeiro das concentrações plasmáticas destes medicamentos.

Tabela de interações

As interações entre o isavuconazol e medicamentos administrados concomitantemente estão enumeradas na Tabela 1 (o aumento é indicado por “↑”, e a diminuição é indicada por “↓”), ordenadas por classe terapêutica. Salvo indicação em contrário, os estudos detalhados na Tabela 1 foram realizados com a dose recomendada de CRESEMBA.

Tabela 1 Interações

Medicamento administrado concomitantemente por área terapêutica	Efeitos nas concentrações do medicamento/ Variação da Média Geométrica (%) na AUC, C_{max} (Modo de ação)	Recomendação relativa à administração concomitante
<i>Anticonvulsivantes</i>		

Medicamento administrado concomitantemente por área terapêutica	Efeitos nas concentrações do medicamento/ Variação da Média Geométrica (%) na AUC, C_{max} (Modo de ação)	Recomendação relativa à administração concomitante
Carbamazepina, fenobarbital e fenitoína (indutores fortes do CYP3A4/5)	As concentrações de isavuconazol podem diminuir (indução do CYP3A pela carbamazepina, fenitoína e barbitúricos de ação prolongada como o fenobarbital).	A administração concomitante de CRESEMBA e carbamazepina, fenitoína e barbitúricos de ação prolongada como o fenobarbital é contraindicada.
Antibacterianos		
Rifampicina (indutor forte do CYP3A4/5)	Isavuconazol: AUC _{tau} : ↓ 90% C _{max} : ↓ 75% (indução do CYP3A4/5)	A administração concomitante de CRESEMBA e rifampicina é contraindicada.
Rifabutina (indutor forte do CYP3A4/5)	Não estudado. As concentrações de isavuconazol podem diminuir significativamente. (indução do CYP3A4/5)	A administração concomitante de CRESEMBA e rifabutina é contraindicada.
Nafcilina (indutor moderado do CYP3A4/5)	Não estudado. As concentrações de isavuconazol podem diminuir significativamente. (indução do CYP3A4/5)	A administração concomitante de CRESEMBA e nafcilina é contraindicada.
Claritomicina (inibidor forte do CYP3A4/5)	Não estudado. As concentrações de isavuconazol podem aumentar. (inibição do CYP3A4/5)	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA; recomenda-se precaução, pois podem aumentar as reações adversas ao medicamento.
Antifúngicos		
Cetoconazol (inibidor forte do CYP3A4/5)	Isavuconazol: AUC _{tau} : ↑ 422% C _{max} : ↑ 9% (inibição do CYP3A4/5)	A administração concomitante de CRESEMBA e cetoconazol é contraindicada.
Medicamentos à base de plantas		
Hipericão (indutor forte do CYP3A4/5)	Não estudado. As concentrações de isavuconazol podem diminuir significativamente. (indução do CYP3A4).	A administração concomitante de CRESEMBA e hipericão é contraindicada.
Imunossupressores		
Ciclosporina, sirolímus, tacrolímus (substratos do CYP3A4/5)	Ciclosporina: AUC _{inf} : ↑ 29% C _{max} : ↑ 6% Sirolímus: AUC _{inf} : ↑ 84% C _{max} : ↑ 65%	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Ciclosporina, sirolímus, tacrolímus: monitorização dos níveis plasmáticos e ajuste da dose, se necessário.

Medicamento administrado concomitantemente por área terapêutica	Efeitos nas concentrações do medicamento/ Variação da Média Geométrica (%) na AUC, C_{max} (Modo de ação)	Recomendação relativa à administração concomitante
	Tacrolimus: AUC _{inf} : ↑ 125% C _{max} : ↑ 42% (inibição do CYP3A4)	
Micofenolato de mofetil (MMF) (substrato da UGT)	Ácido micofenólico (MPA, metabolito ativo): AUC _{inf} : ↑ 35% C _{max} : ↓ 11% (inibição da UGT)	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. MMF: é recomendada a monitorização de toxicidades associadas do MPA.
Prednisona (substrato do CYP3A4)	Prednisolona (metabolito ativo): AUC _{inf} : ↑ 8% C _{max} : ↓ 4% (inibição do CYP3A4) As concentrações de isavuconazol podem diminuir. (indução do CYP3A4/5)	A administração concomitante deve ser evitada, a menos que se considere que os potenciais benefícios prevalecem sobre os riscos.
Opióides		
Opiáceos de curta duração (alfentanil, fentanil) (substrato do CYP3A4/5)	Não estudado. As concentrações dos opiáceos de curta duração podem aumentar. (inibição do CYP3A4/5).	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Opiáceos de curta duração (alfentanilo, fentanilo): monitorização cuidadosa de qualquer ocorrência de toxicidade medicamentosa e redução da dose, se necessário.
Metadona (substrato do CYP3A4/5, 2B6 e 2C9)	S-metadona (isómero opiáceo inativo) AUC _{inf} : ↓ 35% C _{max} : ↑ 1% 40% de redução em semivida terminal R-metadona (isómero opiáceo ativo). AUC _{inf} : ↓ 10% C _{max} : ↑ 4% (indução do CYP2B6)	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Metadona: não é necessário qualquer ajuste da dose.
Anticancerígenos		
Alcaloides da vinca (vincristina, vinblastina) (substratos da P-gp)	Não estudado. As concentrações dos alcaloides da vinca podem aumentar. (inibição da P-gp)	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Alcaloides da vinca: monitorização cuidadosa de qualquer ocorrência de

Medicamento administrado concomitantemente por área terapêutica	Efeitos nas concentrações do medicamento/ Variação da Média Geométrica (%) na AUC, C_{max} (Modo de ação)	Recomendação relativa à administração concomitante
		toxicidade medicamentosa e redução da dose, se necessário.
Ciclofosfamida (substrato do CYP2B6)	Não estudado. As concentrações de ciclofosfamida podem diminuir. (indução do CYP2B6)	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Ciclofosfamida: monitorização cuidadosa de qualquer ocorrência de falta de eficácia e aumento da dose, se necessário.
Metotrexato (substrato da BCRP, OAT1, OAT3)	Metotrexato: AUC _{inf} : ↓ 3% C _{max} : ↓ 11% 7-hidroxi-metabolito: AUC _{inf} : ↑ 29% C _{max} : ↑ 15% (Mecanismo desconhecido)	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Metotrexato: não é necessário qualquer ajuste da dose.
Outros agentes anticancerígenos (daunorrubicina, doxorubicina, imatinib, irinotecano, lapatinib, mitoxantrona, topotecano) (substratos da BCRP)	Não estudado. As concentrações de daunorrubicina, doxorubicina, imatinib, irinotecano, lapatinib, mitoxantrona e topotecano podem aumentar. (inibição da BCRP)	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. daunorrubicina, doxorubicina, imatinib, irinotecano, lapatinib, mitoxantrona ou topotecano: monitorização cuidadosa de qualquer ocorrência de toxicidade medicamentosa e redução da dose, se necessário.
Antieméticos		
Aprepitant (indutor ligeiro do CYP3A4/5)	Não estudado. As concentrações de isavuconazol podem diminuir. (indução do CYP3A4/5)	A administração concomitante deve ser evitada, a menos que se considere que os potenciais benefícios prevalecem sobre os riscos.
Antidiabéticos		
Metformina (substrato do OCT1, OCT2 e MATE1)	Metformina: AUC _{inf} : ↑ 52% C _{max} : ↑ 23% (inibição do OCT2)	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Metformina: pode ser necessária a redução a dose.
Repaglinida (substrato do CYP2C8 e OATP1B1)	Repaglinida: AUC _{inf} : ↓ 8% C _{max} : ↓ 14%	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Repaglinida: não é necessário qualquer ajuste da dose.
Anticoagulantes		
Dabigatran etexilato (substrato da P-gp)	Não estudado. As concentrações de dabigatran etexilato podem aumentar. (inibição da P-gp).	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. O dabigatran etexilato tem um índice terapêutico estreito e deve ser monitorizado, procedendo-se à redução da dose, se necessário.

Medicamento administrado concomitantemente por área terapêutica	Efeitos nas concentrações do medicamento/ Variação da Média Geométrica (%) na AUC, C_{max} (Modo de ação)	Recomendação relativa à administração concomitante
Varfarina (substrato do CYP2C9)	S-varfarina AUC _{inf} : ↑ 11% C _{max} : ↓ 12% R-varfarina AUC _{inf} : ↑ 20% C _{max} : ↓ 7%	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Varfarina: não é necessário qualquer ajuste da dose.
Agentes antirretrovirais		
Lopinavir 400 mg / Ritonavir 100 mg (inibidores fortes e substratos do CYP3A4/5)	Lopinavir: AUC _{tau} : ↓ 27% C _{max} : ↓ 23% C _{min, ss} : ↓ 16% Ritonavir: AUC _{tau} : ↓ 31% C _{max} : ↓ 33% (Mecanismo desconhecido) Isavuconazol: AUC _{tau} : ↑ 96% C _{max} : ↑ 74% (inibição do CYP3A4/5)	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA; recomenda-se precaução, pois podem aumentar as reações adversas ao medicamento. Lopinavir/ritonavir: não é necessário qualquer ajuste da dose para lopinavir 400 mg / ritonavir 100 mg a cada 12 horas, mas os doentes devem ser monitorizados para qualquer ocorrência de falta de eficácia antiviral.
Ritonavir (a doses >200 mg a cada 12 horas) (indutor forte do CYP3A4/5)	Não estudado. As concentrações de isavuconazol podem diminuir significativamente com doses elevadas de ritonavir. (indução do CYP3A4/5)	A administração concomitante de CRESEMBA e doses elevadas de ritonavir (>200 mg a cada 12 horas) é contraindicada.
Efavirenz (indutor moderado do CYP3A4/5 e substrato do CYP2B6)	Não estudado. As concentrações de efavirenz podem diminuir. (indução do CYP2B6) As concentrações de isavuconazol podem diminuir significativamente. (indução do CYP3A4/5)	A administração concomitante de CRESEMBA e efavirenz é contraindicada.
Etravirina (indutor moderado do CYP3A4/5)	Não estudado. As concentrações de isavuconazol podem diminuir significativamente. (indução do CYP3A4/5)	A administração concomitante de CRESEMBA e etravirina é contraindicada.
Indinavir (inibidor forte e substrato do CYP3A4/5)	Indinavir:b) AUC _{inf} : ↓ 36% C _{max} : ↓ 52% (Mecanismo desconhecido)	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA; recomenda-se precaução, pois podem aumentar as reações adversas ao medicamento. Indinavir: monitorização

Medicamento administrado concomitantemente por área terapêutica	Efeitos nas concentrações do medicamento/ Variação da Média Geométrica (%) na AUC, C_{max} (Modo de ação)	Recomendação relativa à administração concomitante
	As concentrações de isavuconazol podem aumentar. (inibição do CYP3A4/5)	cuidadosa de qualquer ocorrência de falta de eficácia antiviral e aumento da dose, se necessário.
Saquinavir (inibidor forte do CYP3A4/5)	Não estudado. As concentrações de saquinavir da protease podem diminuir (tal como observado com o lopinavir/ritonavir) ou aumentar (inibição do CYP3A4). As concentrações de isavuconazol podem aumentar. (inibição do CYP3A4/5).	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA; recomenda-se precaução, pois podem aumentar as reações adversas ao medicamento. Saquinavir: monitorização cuidadosa de qualquer ocorrência de toxicidade medicamentosa e/ou falta de eficácia antiviral, e ajuste da dose, se necessário
Outros inibidores da protease (por ex., amprenavir, nelfinavir) (inibidores fortes ou moderados e substratos do CYP3A4/5)	Não estudado. As concentrações do inibidor da protease podem diminuir (tal como observado com o lopinavir/ritonavir) ou aumentar. (inibição do CYP3A4) As concentrações de isavuconazol podem aumentar. (inibição do CYP3A4/5).	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Inibidores da protease: monitorização cuidadosa de qualquer ocorrência de toxicidade medicamentosa e/ou falta de eficácia antiviral, e ajuste da dose, se necessário.
Outros NNRTI (por ex., delavirdina e nevirapina) (indutores e substratos do CYP3A4/5 e 2B6)	Não estudado. As concentrações dos NNRTI podem diminuir (indução do CYP2B6 pelo isavuconazol) ou aumentar. (inibição do CYP3A4/5)	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. NNRTI: monitorização cuidadosa de qualquer ocorrência de toxicidade medicamentosa e/ou falta de eficácia antiviral, e ajuste da dose, se necessário.
Antiácidos		
Esomeprazol (substrato do CYP2C19 e pH gástrico↑)	Isavuconazol: AUC _{tau} : ↑ 8% C _{max} : ↑ 5%	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Esomeprazol: não é necessário qualquer ajuste da dose.
Omeprazol (substrato do CYP2C19 e pH gástrico↑)	Omeprazol: AUC _{inf} : ↓ 11% C _{max} : ↓ 23%	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Omeprazol: não é necessário qualquer ajuste da dose.
Antidislipídicos		
Atorvastatina e outras estatinas (substratos do CYP3A4, por ex., sinvastatina, lovastatina, rosuvastatina) (substratos do CYP3A4/5 e/ou	Atorvastatina: AUC _{inf} : ↑ 37% C _{max} : ↑ 3% Não foram estudadas outras estatinas.	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Com base nos resultados com a atorvastatina, não é necessário qualquer ajuste da dose das

Medicamento administrado concomitantemente por área terapêutica	Efeitos nas concentrações do medicamento/ Variação da Média Geométrica (%) na AUC, C_{max} (Modo de ação)	Recomendação relativa à administração concomitante
BCRP)	As concentrações das estatinas podem aumentar. (inibição do CYP3A4/5 ou BCRP)	estatinas. Recomenda-se a monitorização de reações adversas típicas das estatinas.
Pioglitazona (indutor ligeiro do CYP3A4/5)	Não estudado. As concentrações de isavuconazol podem diminuir. (indução do CYP3A4/5)	A administração concomitante deve ser evitada, a menos que se considere que os potenciais benefícios prevalecem sobre os riscos.
Antiarrítmicos		
Digoxina (substrato da P-gp)	Digoxina: AUC _{inf} : ↑ 25% C _{max} : ↑ 33% (inibição da P-gp)	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Digoxina: as concentrações da digoxina sérica devem ser monitorizadas e utilizadas para titulação da dose de digoxina.
Contraceptivos orais		
Etinilestradiol e noretindrona (substratos do CYP3A4/5)	Etinilestradiol AUC _{inf} : ↑ 8% C _{max} : ↑ 14% Noretindrona AUC _{inf} : ↑ 16% C _{max} : ↑ 6%	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Etinilestradiol e noretindrona: não é necessário qualquer ajuste da dose.
Antitússicos		
Dextrometorfano (substrato do CYP2D6)	Dextrometorfano: AUC _{inf} : ↑ 18% C _{max} : ↑ 17% Dextroorfano (metabolito ativo): AUC _{inf} : ↑ 4% C _{max} : ↓ 2%	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Dextrometorfano: não é necessário qualquer ajuste da dose.
Benzodiazepinas		
Midazolam (substrato do CYP3A4/5)	Midazolam oral: AUC _{inf} : ↑ 103% C _{max} : ↑ 72% (inibição do CYP3A4)	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Midazolam: recomenda-se a monitorização cuidadosa de sinais clínicos e sintomas, e a redução da dose, se necessário.
Agente antigotoso		
Colquicina (substrato da P-gp)	Não estudado. As concentrações de colquicina podem aumentar. (inibição da P-gp)	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. A colquicina tem um índice terapêutico estreito e deve ser monitorizada, procedendo-se à redução da dose, se necessário.
Produtos naturais		
Cafeína (substrato do CYP1A2)	Cafeína: AUC _{inf} : ↑ 4%	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA.

Medicamento administrado concomitantemente por área terapêutica	Efeitos nas concentrações do medicamento/ Variação da Média Geométrica (%) na AUC, C_{max} (Modo de ação)	Recomendação relativa à administração concomitante
	C _{max} : ↓ 1%	Cafeína: não é necessário qualquer ajuste da dose.
Adjuvantes na cessação dos hábitos tabágicos		
Bupropiom (substrato do CYP2B6)	Bupropiom: AUC _{inf} : ↓ 42% C _{max} : ↓ 31% (indução do CYP2B6)	Não é necessário qualquer ajuste da dose de CRESEMBA. Bupropiom: aumentar a dose, se necessário.

NNRTI, inibidores não nucleosídeos da transcriptase inversa; P-gp, P-glicoproteína.

a) % de redução dos valores de nível mínimo médios

b) O indinavir só foi estudado após uma dose única de 400 mg de isavuconazol.

AUC_{inf} = área debaixo da curva de concentração no plasma vs. tempo extrapolada ao infinito; AUC_{tau} = área debaixo da curva de concentração no plasma vs. tempo durante o intervalo de 24 horas num estado estacionário; C_{max} = pico de concentração no plasma; C_{min,ss} = níveis mínimos num estado estacionário.

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento

Gravidez

Os dados sobre a utilização de CRESEMBA em mulheres grávidas são inexistentes.

Estudos em animais revelaram toxicidade reprodutiva (ver secção 5.3). O risco potencial para os seres humanos é desconhecido.

CRESEMBA não deve ser utilizado durante a gravidez, exceto em doentes com infeções fúngicas graves ou potencialmente fatais, nas quais o isavuconazol poderá ser utilizado se os benefícios antecipados prevalecerem sobre os possíveis riscos para o feto.

Mulheres com potencial para engravidar

CRESEMBA não é recomendado para mulheres com potencial para engravidar que não utilizem contraceção.

Amamentação

Os dados farmacodinâmicos/toxicológicos disponíveis em animais revelaram a excreção do isavuconazol/metabolitos no leite (ver secção 5.3).

Não é de excluir um possível risco para recém-nascidos e lactentes.

A amamentação deve ser descontinuada durante o tratamento com CRESEMBA.

Fertilidade

Não estão disponíveis dados sobre o efeito do isavuconazol na fertilidade humana. Os estudos em animais não revelaram diminuição da fertilidade em ratos machos ou fêmeas (ver secção 5.3).

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

O isavuconazol tem um potencial moderado de influenciar a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. Os doentes devem evitar conduzir ou utilizar máquinas se tiverem sintomas de estado confusional, sonolência, síncope e/ou tonturas.

4.8 Efeitos indesejáveis

Resumo do perfil de segurança

A frequência das reações adversas mostradas na Tabela 2 baseia-se em dados de 403 doentes com infeções fúngicas invasivas tratados com CRESEMBA em ensaios de fase 3.

As reações adversas relacionadas com o tratamento mais comuns foram valores elevados dos testes químicos ao fígado (7,9%), náuseas (7,4%), vômitos (5,5%), dispneia (3,2%), dor abdominal (2,7%), diarreia (2,7%), reações no local da injeção (2,2%), cefaleia (2,0%), hipocalcemia (1,7%) e erupção cutânea (1,7%).

As reações adversas que, com mais frequência, levaram à interrupção do tratamento com CRESEMBA foram estado confusional (0,7%), compromisso renal agudo (0,7%), aumento da bilirrubina no sangue (0,5%), convulsão (0,5%), dispneia (0,5%), epilepsia (0,5%), falência respiratória (0,5%) e vômitos (0,5%).

Tabela com lista de reações adversas

A Tabela 2 apresenta as reações adversas ao isavuconazol no tratamento de infeções fúngicas invasivas, por Sistema de Classes de Órgãos e frequência.

A frequência das reações adversas é definida da seguinte forma: muito frequentes ($\geq 1/10$); frequentes ($\geq 1/100$ a $< 1/10$); e pouco frequentes ($\geq 1/1.000$ a $< 1/100$).

Dentro de cada grupo de frequência, as reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade.

Tabela 2 Resumo das reações adversas pelo Sistema de Classes de Órgãos MedDRA e por frequência

Sistema de Classes de Órgãos	Reações Adversas ao Medicamento
Doenças do sangue e do sistema linfático	
Pouco frequentes	Neutropenia; Trombocitopenia [^] ; Pancitopenia; Leucopenia [^] ; Anemia [^]
Doenças do sistema imunitário	
Pouco frequentes	Hipersensibilidade [^]
Doenças do metabolismo e da nutrição	
Frequentes	Hipocalemia; Apetite diminuído
Pouco frequentes	Hipomagnesemia; Hipoglicemia; Hipoalbuminemia; Malnutrição [^]
Perturbações do foro psiquiátrico	
Frequentes	Delírio ^{^#}
Pouco frequentes	Depressão; Insónia [^]
Doenças do sistema nervoso	
Frequentes	Cefaleia; Sonolência
Pouco frequentes	Convulsão [^] ; Síncope; Tontura; Parestesia [^] ; Encefalopatia; Pré-síncope; Neuropatia periférica; Disgeusia;
Sistema de Classes de Órgãos	
Reações Adversas ao Medicamento	
Afeções do ouvido e do labirinto	
Pouco frequentes	Vertigens
Cardiopatias	
Pouco frequentes	Fibrilação auricular; Taquicardia; Bradicardia [^] ; Palpitações <i>Flutter</i> auricular; Intervalo QT curto no eletrocardiograma; Taquicardia supraventricular; Extrassístoles ventriculares; Extrassístoles supraventriculares
Vasculopatias	
Frequentes	Tromboflebite [^]
Pouco frequentes	Colapso circulatório; Hipotensão
Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino	
Frequentes	Dispneia; [^] Falência respiratória aguda [^]
Pouco frequentes	Broncospasmo; Taquipneia; Hemoptise; Epistaxe
Doenças gastrointestinais	
Frequentes	Vômitos; Diarreia; Náuseas; Dor abdominal [^] ;
Pouco frequentes	Dispepsia; Obstipação; Distensão abdominal
Afeções hepatobiliares	
Frequentes	Valores elevados dos testes químicos ao fígado ^{^#}
Pouco frequentes	Hepatomegalia; Hepatite

Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos	
Frequentes	Erupção cutânea [^] ; Prurido
Pouco frequentes	Petéquias; Alopecia; Erupção medicamentosa; Dermatite [^]
Afeções musculoesqueléticas e dos tecidos conjuntivos	
Pouco frequentes	Dor lombar
Doenças renais e urinárias	
Frequentes	Compromisso renal
Perturbações gerais e alterações no local de administração	
Frequentes	Dor torácica [^] ; Fadiga
Pouco frequentes	Mal-estar geral; Astenia

[^] Indica que ocorreu o agrupamento de termos preferidos apropriados num único conceito médico.

Ver secção Descrição de reações adversas selecionadas, abaixo

Descrição de reações adversas selecionadas

Delírio inclui reações de estado confusional.

Os valores elevados dos testes químicos ao fígado incluem eventos de aumento da alanina aminotransferase, aumento do aspartato aminotransferase, aumento da fosfatase alcalina no sangue, aumento da bilirrubina no sangue, aumento da desidrogenase láctica no sangue, aumento da gamaglutamiltransferase, aumento da enzima hepática, função hepática anormal, hiperbilirrubinemia, teste de função hepática anormal e aumento das transaminases.

Efeitos laboratoriais

Num ensaio clínico aleatorizado, em dupla ocultação e com controlo ativo, realizado com 516 doentes com doença fúngica invasiva causada por uma espécie de *Aspergillus* ou outro fungo filamentoso, foi comunicado um nível elevado de transaminases no fígado (alanina aminotransferase ou aspartato aminotransferase) superior a 3 vezes o limite superior do normal (ULN) no final do tratamento do ensaio em 4,4% dos doentes que receberam CRESEMBA. Aumentos acentuados das transaminases hepáticas, superiores a 10 vezes o ULN, desenvolveram-se em 1,2% dos doentes a tomar isavuconazol.

Notificação de suspeitas de reações adversas

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através:

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 7373

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

4.9 Sobredosagem

Sintomas

Os sintomas referidos com doses supraterapêuticas de CRESEMBA (equivalente a 600 mg de isavuconazol por dia), avaliados num estudo de QT, com maior frequência do que no grupo da dose terapêutica (equivalente a 200 mg de isavuconazol por dia) incluíram: cefaleia, tontura, parestesia, sonolência, perturbação da atenção, disgeusia, boca seca, diarreia, hipoestesia oral, vômitos, afrontamentos, ansiedade, agitação, palpitações, taquicardia, fotofobia e artralgia.

Gestão da sobredosagem

O isavuconazol não é removido por hemodiálise. Não existe nenhum antídoto específico para o isavuconazol. Em caso de sobredosagem, deve ser instituído tratamento de suporte.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: Antimicóticos para uso sistémico, derivados triazólicos, código ATC: J02AC05

Mecanismo de ação

O isavuconazol é a parte ativa formada após a administração oral ou intravenosa de sulfato de isavuconazônio (ver secção 5.2).

O isavuconazol demonstra um efeito fungicida ao bloquear a síntese do ergosterol, um componente fundamental da membrana celular fúngica, através da inibição da enzima 14 alfa-lanosterol demetilase, dependente do citocromo P-450, responsável pela conversão do lanosterol em ergosterol. Isto resulta numa acumulação de precursores esteróis metilados e numa perda de ergosterol da membrana celular, enfraquecendo assim a estrutura e a função da membrana celular fúngica.

Microbiologia

Em modelos animais de aspergilose disseminada e pulmonar, o índice farmacodinâmico (PD) importante na eficácia é a exposição dividida pela concentração inibitória mínima (CIM) (AUC/CIM).

Não foi possível estabelecer nenhuma correlação clara entre a concentração inibitória mínima (CIM) *in vitro* e a resposta clínica para as diferentes espécies (*Aspergillus* e *Mucorales*).

As concentrações de isavuconazol necessárias para inibir as espécies de *Aspergillus* e os géneros/espécies da ordem *Mucorales in vitro* foram variáveis. Geralmente, as concentrações de isavuconazol necessárias para inibir *Mucorales* são superiores às necessárias para inibir a maioria das espécies de *Aspergillus*.

Foi demonstrada eficácia clínica contra as seguintes espécies de *Aspergillus*: *Aspergillus fumigatus*, *A. flavus*, *A. niger* e *A. terreus* (ver mais abaixo).

Mecanismo(s) de resistência

A suscetibilidade reduzida a agentes antifúngicos triazólicos foi associada a mutações dos genes *cyp51A* e *cyp51B* fúngicos que codificam a proteína-alvo 14 alfa-lanosterol demetilase envolvida na biossíntese do ergosterol. Foram comunicadas estirpes fúngicas com reduzida

suscetibilidade *in vitro* ao isavuconazol, e não é de excluir a resistência cruzada ao voriconazol e outros agentes antifúngicos triazólicos.

Breakpoints

Os *breakpoints* de CIM do EUCAST são definidos para as seguintes espécies (suscetíveis S; resistentes R):

- *Aspergillus fumigatus*: S ≤ 1 mg/l, R > 1 mg/l
- *Aspergillus nidulans*: S ≤ 0,25 mg/l, R > 0,25 mg/l
- *Aspergillus terreus*: S ≤ 1 mg/l, R > 1 mg/l

Existem atualmente dados insuficientes para definir *breakpoints* clínicos para outras espécies de *Aspergillus*.

Eficácia e segurança clínicas

Tratamento da aspergilose invasiva

A segurança e a eficácia do isavuconazol no tratamento de doentes com aspergilose invasiva foram avaliadas num ensaio clínico em dupla ocultação e com controlo-ativo, realizado com 516 doentes com doença fúngica invasiva causada por uma espécie de *Aspergillus* ou outro fungo filamentosos. Na população com intenção de tratar (ITT), 258 doentes receberam isavuconazol e 258 doentes receberam voriconazol. CRESEMBA foi administrado por via intravenosa (equivalente a 200 mg de isavuconazol) a cada 8 horas, durante as primeiras 48 horas, seguido de um tratamento diário intravenoso ou oral (equivalente a 200 mg de isavuconazol). A duração máxima do tratamento definida no protocolo foi de 84 dias. A duração mediana do tratamento foi de 45 dias.

A resposta global no fim do tratamento (EOT) na população myITT (doentes com aspergilose invasiva comprovada e provável, com base em exames de citologia, histologia, cultura ou galactomannan) foi avaliada em ocultação por um Comité Independente de Monitorização de Dados. A população myITT era constituída por 123 doentes a receber isavuconazol e 108 doentes a receber voriconazol. A resposta geral nesta população foi de n = 43 (35%) para o isavuconazol e n = 42 (38,9%) para o voriconazol. A diferença ajustada entre os tratamentos (voriconazol-isavuconazol) foi de 4,0 (intervalo de confiança de 95%: -7,9; 15,9).

A mortalidade «por todas as causas» no Dia 42 nesta população foi de 18,7% para o isavuconazol e 22,2% para o voriconazol. A diferença ajustada entre os tratamentos (isavuconazol-voriconazol) foi de 2,7% (intervalo de confiança de 95%: -12,9; 7,5).

Tratamento da mucormicose

Num ensaio aberto, não controlado, 37 doentes com mucormicose comprovada ou provável receberam isavuconazol no mesmo regime de dosagem utilizado para tratar a aspergilose invasiva. A duração mediana do tratamento foi de 84 dias para a população geral de doentes com mucormicose, e 102 dias para os 21 doentes não anteriormente tratados para a mucormicose. Para doentes com mucormicose provável ou comprovada, conforme definido pelo Comité Independente de Monitorização de Dados (CIMD), a mortalidade «por todas as causas» no Dia 84 foi de 43,2% (16/37) para a população geral de doentes, de 42,9% (9/21) para os doentes com mucormicose que receberam isavuconazol como tratamento primário, e de 43,8% (7/16) para os doentes com mucormicose a receber isavuconazol que não responderam ou desenvolveram intolerância a terapias antifúngicas anteriores (principalmente tratamentos à base de anfotericina B). Segundo a avaliação do CIMD, a taxa de sucesso global no fim do tratamento foi de 11/35 (31,4%), tendo sido 5 doentes considerados completamente curados e 6 doentes parcialmente curados. Foi observada uma resposta estável noutros 10/35 doentes

(28,6%). Em 9 doentes com mucormicose causada por *Rhizopus* spp., 4 doentes revelaram uma resposta favorável ao isavuconazol. Em 5 doentes com mucormicose causada por *Rhizomucor* spp., não foram observadas quaisquer respostas favoráveis. A experiência clínica com outras espécies é muito limitada (*Lichtheimia* spp. n=2, *Cunninghamella* spp. n=1, *Actinomucor elegans* n=1).

População pediátrica

A Agência Europeia de Medicamentos deferiu a obrigação de submeter os resultados de ensaios com CRESEMBA num ou mais subgrupos da população pediátrica no tratamento de aspergilose invasiva e no tratamento de mucormicose (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica).

5.2 Propriedades farmacocinéticas

O sulfato de isavuconazónio é um pró-fármaco solúvel em água que pode ser administrado sob a forma de perfusão intravenosa ou oralmente sob a forma de cápsulas. Após a administração, o sulfato de isavuconazónio é rapidamente hidrolisado pelas esterases do plasma na parte ativa, o isavuconazol; as concentrações plasmáticas do pró-fármaco são muito baixas e detetáveis apenas durante um curto período de tempo após a dosagem intravenosa.

Absorção

Após a administração oral de CRESEMBA em indivíduos saudáveis, a parte ativa, o isavuconazol, é absorvida e alcança as concentrações plasmáticas máximas (C_{max}) cerca de 2–3 horas após dose única e múltipla (ver Tabela 3).

Tabela 3 Parâmetros farmacocinéticos do isavuconazol em estado estacionário após administração oral de CRESEMBA

Parâmetro Estatística	Isavuconazol 200 mg (n = 37)	Isavuconazol 600 mg (n = 32)
C_{max} (ng/ml)		
Média	7499	20028
DP	1893,3	3584,3
CV %	25,2	17,9
t_{max} (h)		
Mediana	3,0	4,0
Intervalo	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0
AUC (h•ng/ml)		
Média	121402	352805
DP	35768,8	72018,5
CV %	29,5	20,4

Como se mostra em baixo, na tabela 4, a biodisponibilidade absoluta do isavuconazol após a administração oral de uma dose única de CRESEMBA é de 98%. Com base nestes dados, as dosagens intravenosa e oral podem ser utilizadas indiferentemente.

Tabela 4 Comparação farmacocinética da dose oral e intravenosa (Média)

	ISA 400 mg oral	ISA 400 mg I.V.
AUC (h•ng/ml)	189462,8	193906,8
CV %	36,5	37,2
Semivida (h)	110	115

Efeito dos alimentos na absorção

A administração oral de CRESEMBA equivalente a 400 mg de isavuconazol com uma refeição com elevado teor de gordura reduziu a C_{max} do isavuconazol em 9% e aumentou a AUC em 9%. CRESEMBA pode ser tomado com ou sem alimentos.

Distribuição

O isavuconazol distribui-se extensivamente, com um volume de distribuição médio no estado estacionário (V_{ss}) de cerca de 450 l. O isavuconazol tem um elevado grau de ligação (> 99%) às proteínas do plasma humano, predominantemente à albumina.

Biotransformação

Os ensaios *in vitro/in vivo* indicam que o CYP3A4, o CYP3A5 e, subsequentemente, a uridina difosfato glucuronosiltransferase estão envolvidos no metabolismo do isavuconazol.

Após doses únicas de [ciano- ^{14}C] isavuconazónio e [piridinilmetil- ^{14}C] sulfato de isavuconazónio em seres humanos, para além da parte ativa (isavuconazol) e do produto de clivagem inativo, foram identificados alguns metabolitos de menor importância. Exceto a parte ativa, o isavuconazol, não foi observado qualquer metabolito individual com uma AUC > 10% no total do material radiomarcado.

Eliminação

Após a administração de sulfato de isavuconazónio radiomarcado a indivíduos saudáveis, uma média de 46,1% da dose radioativa foi recuperada nas fezes e 45,5% na urina.

A excreção renal do isavuconazol intacto foi inferior a 1% da dose administrada.

O produto de clivagem inativo é primariamente eliminado pelo metabolismo e posterior excreção renal dos metabolitos.

Linearidade/não linearidade

Estudos em indivíduos saudáveis demonstraram que a farmacocinética do isavuconazol é proporcional até 600 mg por dia.

Farmacocinética em populações especiais

Doentes pediátricos

A farmacocinética em doentes pediátricos (< 18 anos) ainda não foi avaliada. Não existem dados disponíveis.

Compromisso renal

Não foram observadas alterações clinicamente relevantes na C_{max} e na AUC totais do isavuconazol em indivíduos com compromisso renal ligeiro, moderado ou grave, comparativamente com indivíduos com funcionamento renal normal. Dos 403 doentes que receberam CRESEMBA nos ensaios de fase 3, 79 (20%) dos doentes tinham uma taxa de filtração glomerular (TFG) estimada inferior a 60 ml/min/1,73 m². Não é necessário qualquer ajuste da dose para doentes com compromisso renal, incluindo doentes com doença renal em fase terminal. O isavuconazol não é prontamente dialisável (ver secção 4.2).

Compromisso hepático

Após a administração de uma dose única de 100 mg dose de isavuconazol a 32 doentes com compromisso hepático ligeiro (Child-Pugh Classe A) e a 32 doentes com compromisso hepático moderado (Child-Pugh Classe B) (16 doentes por via intravenosa e 16 oral doentes por via oral por classe Child-Pugh), a média dos quadrados mínimos da exposição sistémica (AUC) aumentou 64% no grupo Child-Pugh Classe A e 84% no grupo Child-Pugh Classe B,

relativamente a 32 indivíduos saudáveis, com a mesma idade e o mesmo peso, e com função hepática normal. As concentrações plasmáticas médias (C_{max}) foram 2% mais baixas no grupo Child-Pugh Classe A e 30% mais baixas no grupo Child-Pugh Classe B. A avaliação farmacocinética do isavuconazol nas populações de indivíduos saudáveis e doentes com disfunção hepática ligeira ou moderada demonstrou que as populações com compromisso hepático ligeiro e moderado tinham valores de depuração (*clearance*, CL) do isavuconazol 40% e 48% mais baixos, respetivamente, do que a população saudável.

Não é necessário qualquer ajuste da dose em doentes com compromisso hepático ligeiro a moderado.

Cresemba não foi estudado em doentes com compromisso hepático grave (Child-Pugh Classe C). A utilização nestes doentes não é recomendada, a menos que se considere que os potenciais benefícios prevaleçam sobre os riscos. Ver secções 4.2 e 4.4.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

Em ratos e coelhos, observou-se uma associação entre o isavuconazol a exposições sistémicas abaixo do nível terapêutico e aumentos da incidência de anomalias esqueléticas (costelas supranumerárias rudimentares) na descendência, relacionados com a dose. Em ratos, foi também observado um aumento da incidência de fusão arco do zigomático na descendência, relacionado com a dose (ver secção 4.6).

A administração de sulfato de isavuconazónio em ratos a uma dose de 90 mg/kg/dia (2,3 vezes a dose de manutenção nos seres humanos [200 mg] com base em mg/m²/dia) durante a gravidez até ao período de desmame revelou um aumento na mortalidade perinatal das crias. A exposição *in utero* à parte ativa, o isavuconazol, não teve qualquer efeito na fertilidade das crias sobreviventes.

A administração intravenosa em ratos lactantes de sulfato de isavuconazónio marcado com ¹⁴C resultou na recuperação do radiomarcador no leite.

O isavuconazol não afetou a fertilidade dos ratos machos ou fêmeas tratados com doses orais até 90 mg/kg/dia (2,3 vezes a dose de manutenção clínica com base em comparações de mg/m²/dia).

O isavuconazol não tem qualquer potencial mutagénico ou genotóxico discernível. O isavuconazol teve resultados negativos num ensaio de mutação reversa bacteriana, revelou ser fracamente clastogénico a concentrações citotóxicas no ensaio de aberrações cromossómicas no linfoma do rato L5178Y tk+/-, e não revelou qualquer aumento biologicamente relevante ou estatisticamente significativo na frequência de micronúcleos num ensaio dos micronúcleos *in vivo* em ratas.

Não foram realizados estudos de carcinogenicidade.

O isavuconazol inibiu o canal de potássio hERG e o canal de cálcio de tipo L com um IC₅₀ de 5,82 µm e 6,57 µm, respetivamente (34 e 38 vezes a C_{max} de ligações não proteicas em humanos à dose máxima recomendada em seres humanos, respetivamente). Os ensaios toxicológicos de dose repetida *in vivo* de 39 semanas em macacos não revelaram o prolongamento do QTcF com doses até 40 mg/kg/dia (2,1 vezes a dose de manutenção clínica recomendada, com base em comparações de mg/m²/dia).

A avaliação de risco ambiental provou que Cresemba pode constituir um risco para o ambiente aquático.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista dos excipientes

Conteúdo da cápsula

citrato de magnésio (anidro)
celulose microcristalina
talco
sílica coloidal anidro
ácido esteárico

Revestimento da cápsula

hipromelose
água
óxido de ferro vermelho (E172) (apenas corpo da cápsula)
dióxido de titânio (E171)
goma gelana
acetato de potássio
edetato dissódico
laurilsulfato de sódio

Tinta de impressão

goma laca
propilenoglicol
hidróxido de potássio
óxido de ferro preto (E172)

6.2 Incompatibilidades

Não aplicável.

6.3 Prazo de validade

30 meses

6.4 Precauções especiais de conservação

Conservar na embalagem original para proteger da humidade.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente

14 cápsulas (em duas embalagens blister de alumínio), com os espaços das cápsulas individuais ligados a um espaço com excipiente.

6.6 Precauções especiais de eliminação

Este medicamento pode constituir um risco para o ambiente (ver secção 5.3).

Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais.

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Basilea Medical Ltd (c/o Cox Costello & Horne Limited)
Langwood House
63–81 High Street
Rickmansworth
Hertfordshire WD3 1EQ
Reino Unido

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

EU/1/15/1036/002

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Data da primeira autorização: 15 de outubro de 2015

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO

13 de dezembro de 2018

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência Europeia de Medicamentos <http://www.ema.europa.eu>.