



زيلجاتز®

(توفاسيتينيب)

أقراص 10 مجم

السوق المرجعية: الولايات المتحدة

الدليل الدوائي

الدليل الدوائي

زيلجانز® 10 مجم (زيل 'جانز') (توفاسيتينيب) أقراص للاستخدام عن طريق الفم

ما هي أهم المعلومات التي يجب علي معرفتها عن عقار زيلجانز / زيلجانز إكس آر؟

ربما يسبب زيلجانز / زيلجانز إكس آر أعراض جانبية خطيرة منها:

- 1. العدوى الخطيرة.** زيلجانز / زيلجانز إكس آر هو أحد الأدوية التي تؤثر على جهازك المناعي. فيمكن لزيلجانز أن يخفض من قدرة جهازك المناعي على مكافحة العدوى. قد يعاني البعض من عدوى خطيرة لدى تناول زيلجانز / زيلجانز إكس آر، منها مرض السل (الدرن) والعدوى التي تسببها البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات التي يمكنها الانتشار في جميع أنحاء الجسم. وقد تسببت هذه العدوى في وفاة بعض الأشخاص.
 - لذلك ينبغي على مقدم الرعاية الصحية الخاص بك اختبار قابليتك للإصابة بالسل قبل بدء المعالجة بزيلجانز / زيلجانز إكس آر واثناء فترة العلاج.
 - كما يجب على مقدم الرعاية الصحية الخاص بك مراقبتك عن كثب لرصد علامات و أعراض الإصابة بالسل أثناء فترة العلاج بزيلجانز / زيلجانز إكس آر.
- لا ينبغي أن تبدأ تناول زيلجانز / زيلجانز إكس آر في حال كنت تعاني من أي نوع من أنواع العدوى ما لم يؤكد لك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أنه لا بأس من تناوله.

قد تكون عرضة أكثر للإصابة بداء القوباء المنطقية. (الحزام الناري)
الأشخاص الذين يتناولون جرعات عالية من زيلجانز (10 مجم مرتين يوميًا) معرضون لخطر أكبر للإصابة بحالات عدوى وقوباء منطقية خطيرة.

قبل بدء تناول زيلجانز / زيلجانز إكس آر أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت:

- تعتقد أنك تعاني من عدوى ما أو لديك أعراض لعدوى ما مثل:

- | | |
|--|--------------------------|
| ○ الحمى أو التعرق أو الرعشة | ○ الآم العضلات |
| ○ السعال | ○ قصر النفس |
| ○ وجود دم في البلغم | ○ فقدان الوزن |
| ○ حرارة أو احمرار أو ألم في الجلد، أو قروح على الجسم | ○ الإسهال أو الآم المعدة |
| ○ حرقة عند التبول أو التبول أكثر من المعتاد | ○ الشعور بالإرهاق الشديد |

- تتلقى علاجًا لعدوى ما
- كثيرًا ما تصاب بعدوى أو تعاني من العدوى نفسها مرارًا
- تعاني من مرض السكري أو مرض رئوي مزمن أو فيروس نقص المناعة البشرية أو ضعف جهازك المناعي. الأشخاص المصابون بهذه الحالات هم الأكثر عرضة للعدوى.
- تعاني من مرض السل، أو كنت على اتصال وثيق بشخص يعاني من مرض السل
- تعيش أو قد عشت أو قد سافرت إلى مناطق معينة في البلاد حيث تتزايد فرصة الإصابة بأنواع معينة من العدوى الفطرية (داء النوسجيات أو الفطار الكرواني (حمى الوادي) أو الفطار البرعمي). قد يؤدي استخدام زيلجانز / زيلجانز إكس آر إلى إصابتك بهذه العدوى أو تفاقمها. إذا لم تكن متأكدًا من إقامتك في إحدى المناطق التي تشيع فيها هذه العدوى فاستشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
- تعاني أو عانيت من الالتهاب الكبدي الفيروسي B أو C بعد بدء تناول زيلجانز / زيلجانز إكس آر اتصل فورًا بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك في حال ظهور أي أعراض لأي عدوى. يمكن لزيلجانز / زيلجانز إكس آر أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أو يعمل على تفاقم أي من العدوى التي تعاني منها.

2. زيادة خطر الوفاة في الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا وأكبر ويعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي ولديهم عامل خطر واحد على الأقل للإصابة بمرض قلبي (قلبي وعائي) ويتناولون جرعة أكبر من الموصى بها من زيلجانز/زيلجانز إكس آر. الجرعة

الموصى بها للمرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي هي زيلجانز 5 مجم مرتين يوميًا أو زيلجانز إكس آر 11 مجم مرة واحدة يوميًا.

3. السرطان ومتاعب جهاز المناعة.

قد يزيد زيلجانز / زيلجانز إكس آر من خطر إصابتك ببعض أنواع السرطان من خلال تغيير طريقة عمل جهازك المناعي.

- يمكن أن تقع الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية وغيره من أنواع السرطان من ضمنها سرطان الجلد لدى المرضى الذين يتناولون زيلجانز / زيلجانز إكس آر. الأشخاص الذين يتناولون جرعات عالية من زيلجانز (10 مجم مرتين يوميًا) معرضون لخطر أكبر للإصابة بسرطان الجلد. أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت قد عانيت من أي نوع من أنواع السرطان في أي وقت مضى.
- عانى بعض الأشخاص الذين كانوا يتناولون زيلجانز مع بعض الأدوية الأخرى لمنع رفض الطعم الكلوي (الكلية المزروعة) من مشكلة خروج بعض خلايا الدم البيضاء عن نطاق السيطرة (مرض التكاثر الليمفاوي الذي يقع بعد زرع الطعم والذي يسببه فيروس إبشتاين-بار).

4. جلطات دموية في الرئتين، وأوردة الساقين أو الذراعين، والشرابين.

لقد حدثت الجلطات الدموية في الرئتين (الانصمام الرئوي، PE)، وأوردة الساقين (الخثار الوريدي العميق، DVT) والشرابين (الخثار الشرياني) بصورة أكبر مع المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي ويبلغون من العمر 50 عامًا وأكبر ولديهم عامل خطر واحد على الأقل للإصابة بمرض قلبي (قلبي وعائي) ويتناولون جرعة أكبر من الموصى بها من زيلجانز/زيلجانز إكس آر. الجرعة الموصى بها للمرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي هي زيلجانز 5 مجم مرتين يوميًا أو زيلجانز إكس آر 11 مجم مرة واحدة يوميًا. حدثت أيضًا جلطات دموية في الرئتين مع المرضى المصابين بالتهاب القولون التقرحي. توفي بعض الأشخاص بسبب تلك الجلطات الدموية.

- توقف عن تناول زيلجانز/زيلجانز إكس آر وأخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فورًا إذا أصبت بأي علامات وأعراض للجلطة الدموية، مثل ضيق التنفس المفاجئ أو صعوبة التنفس أو ألم الصدر أو تورم الساق أو الذراع أو ألم أو إيلام الساقين أو احمرار أو تغير اللون في الساق أو الذراع

5. تمزقات (انتقاب) المعدة أو الأمعاء.

- أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاني من التهاب الرتج (التهاب أجزاء من الأمعاء الغليظة) أو قرحة بمعدتك أو أمعائك. يعاني بعض الأشخاص الذين يتناولون زيلجانز / زيلجانز إكس آر من تمزقات بالمعدة أو الأمعاء. وهذا يحدث في أغلب الأحيان لدى الأشخاص الذين يتناولون أيضًا مضادات الالتهابات غير الستيرويدية (NSAID) أو الكورتيكوستيرويدات أو الميثوتريكسات.
- أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فورًا إذا كنت تعاني من حمى وآلام مستمرة في منطقة المعدة وتغير في عادات التغوط لديك.

6. تفاعلات حساسية.

لوحظت أعراض مثل تورم الشفتين، أو اللسان، أو الحلق، أو الشرى (يقع حمراء بارزة في الجلد تثير عادة حكة شديدة) وهو ما قد يعني إصابتك بتفاعل حساسية لوحظ لدى المرضى الذين يتناولون زيلجانز/زيلجانز إكس آر. كانت بعض هذه التفاعلات خطيرة. إذا حدثت أي من هذه التفاعلات أثناء تناولك زيلجانز/زيلجانز إكس آر، فأوقف استخدام زيلجانز/زيلجانز إكس آر واتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور

7. تغيرات في بعض نتائج الاختبارات المعملية.

يجب على مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إجراء اختبارات للدم قبل بدء تلقيك زيلجانز / زيلجانز إكس آر وأثناء تناوله للتحقق من عدم ظهور الأعراض الجانبية التالية:

- تغيرات في عدد الخلايا الليمفاوية. الخلايا الليمفاوية هي خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على محاربة العدوى.

- **انخفاض عدد العدلات.** العدلات هي خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على محاربة العدوى.
- **انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.** ربما يعني ذلك أنك تعاني من فقر الدم، مما قد يجعلك تشعر بالضعف والإرهاق.

يجب على مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إجراء بعض اختبارات الكبد روتينياً.

يجب عليك ألا تتلقي زيلجانز / زيلجانز إكس آر إذا كان عدد الخلايا الليمفاوية أو العدلات أو خلايا الدم الحمراء شديداً الانخفاض أو كانت قيم نتائج اختبارات الكبد شديدة الارتفاع.

ربما يقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بوقف العلاج بزيلجانز لبعض الوقت إذا لزم الأمر بسبب تغير نتائج اختبارات الدم. ربما يكون لديك أيضاً تغيرات في الاختبارات المعملية الأخرى مثل مستويات الكوليسترول في الدم. يجب على مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إجراء اختبارات الدم لفحص مستويات الكوليسترول لديك بعد بدء تلقيك زيلجانز / زيلجانز إكس آر بـ 4 إلى 8 أسابيع وحسب الحاجة بعد ذلك. يُعد الحفاظ على مستويات طبيعية من الكوليسترول أمراً ضرورياً لسلامة صحة القلب.

انظر "ما هي الأعراض الجانبية المحتملة لزيلجانز / زيلجانز إكس آر ؟" للحصول على المزيد من المعلومات حول الأعراض الجانبية.

ما هو زيلجانز / زيلجانز إكس آر ؟

زيلجانز / زيلجانز إكس آر هو أحد الأدوية الموصوفة طبيًا والمسماة بمثبطات جانوس كيناز (JAK). يستخدم زيلجانز / زيلجانز إكس آر لمعالجة البالغين الذين يعانون من مرض التهاب المفاصل الروماتويدي النشط المتوسط إلى الشديد، والذين لم يحقق لديهم العلاج بالميثوتريكسات النتائج المرجوة أو الذين لم يتحملوه.

يستخدم زيلجانز / زيلجانز إكس آر في علاج البالغين المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي النشط الذي لم يعمل فيه ميثوتريكسات أو الأدوية الأخرى التي تسمى بالعقاقير المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض غير الحيوية (DMARD) بشكل جيد أو الذين لم يتحملوها. يستخدم زيلجانز / زيلجانز إكس آر لعلاج البالغين المصابين بالتهاب القولون التقرحي النشط المتوسط إلى الشديد والذين لم يحقق لديهم العلاج بالأدوية التي تسمى حاصرات عامل النخر الورمي (TNF) النتائج المرجوة أو الذين لم يتحملوها.

لا يُعرف إذا كان زيلجانز / زيلجانز إكس آر آمناً وفعالاً للأشخاص الذين يعانون من الالتهاب الكبدي الفيروسي B أو C أم لا.

لا يوصى بإعطاء زيلجانز / زيلجانز إكس آر للأشخاص الذين يعانون من مشكلات حادة في الكبد.

لا يُعرف إذا كان زيلجانز / زيلجانز إكس آر آمناً وفعالاً للأطفال أم لا.

ما الذي يجب أن أخبر به مقدم الرعاية الصحية الخاص بي قبل أن أتناول زيلجانز / زيلجانز إكس آر ؟
أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن جميع الحالات الطبية التي تعاني منها، قبل تناول زيلجانز / زيلجانز إكس آر، بما في ذلك إذا كنت:

- تعاني من عدوى ما. انظر "ما هي أهم المعلومات التي يجب علي معرفتها عن عقار زيلجانز / زيلجانز إكس آر ؟"
- قد عانيت من جلطات دموية في أوردة ساقيك أو ذراعيك أو رئتيك أو جلطات في الشرايين في الماضي.
- تعاني من مشاكل في الكبد.
- تعاني من مشاكل في الكلى.
- تعاني من أية آلام في منطقة المعدة (البطن) أو تم تشخيص إصابتك بداء التهاب الرتج أو قرحة بمعدتك أو أمعائك.
- لديك حساسية للتوفاسيتينيب أو أي من مكونات زيلجانز / زيلجانز إكس آر.
- تلقيت مؤخرًا أو من المقرر أن تتلقى لقاحًا معينًا. يجب على الأشخاص الذين يتناولون زيلجانز / زيلجانز إكس آر ألا يتلقوا لقاحات حية يمكن للأشخاص الذين يتناولون زيلجانز تلقي لقاحات ميةة.
- حاملًا أو تعتزمين الحمل. يمكن أن يؤثر زيلجانز / زيلجانز إكس آر على قدرة الإنثاء على الحمل. لا يعرف إذا كان هذا التأثير سوف يتغير بعد إيقاف زيلجانز / زيلجانز إكس آر أم لا. لا يُعرف إذا كان زيلجانز / زيلجانز إكس آر سيضر بالجنين أم لا.
- ترضعين وليدك أو تعتزمين ذلك. عليك تقديم الرعاية الصحية الخاص بك اتخاذ القرار؛ إما أن تتناولي زيلجانز / زيلجانز إكس آر أو ترضعين طفلك. لا يمكنك القيام بكليهما بعد إيقاف العلاج بزيلجانز / زيلجانز إكس آر، لا تقومي باستئناف الرضاعة الطبيعية إلا بعد:
 - 18 ساعة من تناول الجرعة الأخيرة من زيلجانز أو
 - 36 ساعة من تناول الجرعة الأخيرة من زيلجانز إكس آر

أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بكافة الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية والفيتامينات والمكملات العشبية الموصوفة طبيًا والتي لا تحتاج لوصفة طبية. ربما يؤثر زيلجانز / زيلجانز إكس آر وغيره من الأدوية على بعضهم البعض مما يؤدي إلى حدوث أعراض جانبية.

أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تتناول:

- أية أدوية أخرى لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، أو التهاب المفاصل الصدفي، أو التهاب القولون التقرحي. يجب ألا تتناول كل من توسيليزوماب (أكتيمرا®) أو إيتانرسبيبت (إنبريل®) أو أداليموماب (هيوميرا®) أو إنفليكسيماب (ريميكيد®) أو ريتوكسيماب (ريتوكسان®) أو أباتاسبت (أورينشيا®) أو أنكينرا (كينيريت®) أو سيرتوليزوماب (سيمزيا®) أو جوليموماب (سيمبوني®) أو أوستيكينوماب (ستيلارا®) أو سيكوكينوماب (كوسنتيكس®) أو فيدوليزوماب (إنتيفيو®) أو آزاثيوبورين أو سايكلوسبورين أو غيرهم من العقاقير المثبطة للمناعة أثناء فترة تناولك زيلجانز / زيلجانز إكس آر. فقد يؤدي تناولك زيلجانز / زيلجانز إكس آر مع هذه الأدوية إلى زيادة خطر إصابتك بالعدوى.

- الأدوية التي تؤثر على طريقة عمل بعض إنزيمات الكبد. واسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ما لم تكن متأكدًا.

تعرف على الأدوية التي تتناولها. واحتفظ بقائمة تضمها ليُتها لمقدم الرعاية الصحية والصيدلي الخاص بك عند حصولك على دواء جديد.

كيف يمكنني تناول زيلجانز / زيلجانز إكس آر ؟

- قم بتناول زيلجانز / زيلجانز إكس آر على النحو الذي يوضحه لك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
- قم بتناول زيلجانز مرتين يوميًا مع الطعام أو بدونه.
- قم بتناول زيلجانز إكس آر مرة واحدة يوميًا مع الطعام أو بدونه.
- ابتلع أقراص زيلجانز إكس آر كاملة وسليمة. لا تسحق أو تقسم أو تمضغ الأقراص.
- عند تناول زيلجانز إكس آر، قد تلاحظ شئطئي البراز يشبه القرص. هذا هو غلاف قرص الدواء الفارغ بعد أن يتم امتصاص الدواء من قبل جسمك.
- إذا قمت بتناول كمية كبيرة جدًا من زيلجانز / زيلجانز إكس آر، اتصل فورًا بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو توجه إلى غرفة الطوارئ بأقرب مستشفى.
- لعلاج التهاب المفاصل الصدفي، تناول زيلجانز / زيلجانز إكس آر مقترنًا مع ميثوتريكسات أو سلفاسالازين أو ليفلونوميد حسب توجيهات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك

ما هي الأعراض الجانبية المحتملة لزيلجانز / زيلجانز إكس آر ؟

ربما يسبب زيلجانز / زيلجانز إكس آر أعراض جانبية خطيرة منها:

- انظر "ما هي أهم المعلومات التي يجب علي معرفتها عن عقار زيلجانز / زيلجانز إكس آر ؟"
- عدوى تنشيط الالتهاب الكبدي الفيروسي B أو C لدى الأشخاص الذين يحملون الفيروس في دماهم. إذا كنت من حاملي فيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي B أو C (الفيروسات التي تؤثر على الكبد)، فربما يصبح الفيروس نشطًا أثناء استخدامك زيلجانز / زيلجانز إكس آر. ربما يقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء اختبارات للدم قبل بدء معالجتك بزيلجانز / زيلجانز إكس آر وأثناء استخدامه. أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية لعدوى الالتهاب الكبدي الفيروسي B أو C المحتملة:

- الشعور بالإرهاق الشديد
- نقص أو فقدان الشهية
- تغير لون البراز إلى لون الطين
- الرعشة
- آلام العضلات
- الطفح الجلدي
- اصفرار الجلد أو العينين
- القيء
- الحمى
- اضطرابات المعدة
- البول داكن اللون

من الأعراض الجانبية الشائعة عند استخدام زيلجانز / زيلجانز إكس آر في المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي والمرضى المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي:

- التهابات الجهاز التنفسي العلوي (الزكام، عدوى الجيوب الأنفية)
- الصداع
- الإسهال
- احتقان الأنف والتهاب الحلق وسيلان الأنف (التهاب البلعوم الأنفي)
- ارتفاع ضغط الدم
- من الأعراض الجانبية الشائعة عند استخدام زيلجانز / زيلجانز إكس آر في المرضى المصابين بالتهاب القولون التقرحي:
- احتقان الأنف والتهاب الحلق وسيلان الأنف (التهاب البلعوم الأنفي)
- ارتفاع مستويات الكوليسترول
- الصداع
- التهابات الجهاز التنفسي العلوي (الزكام، عدوى الجيوب الأنفية)
- زيادة مستويات الإنزيمات العضلية
- الطفح الجلدي
- الإسهال
- داء القوباء المنطقية (الهربس النطاقي أو الحزام الناري)

أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاني من أية أعراض جانبية مستمرة أو تسبب لك الانزعاج.

إذا تعرضت لأي آثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. يشتمل هذا على أي آثار جانبية محتملة وغير مدرجة في هذه النشرة. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عبر نظام الإبلاغ القومي. إبلاغك عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

لا تقتصر الأعراض الجانبية المحتملة لزيلجانز / زيلجانز إكس آر على هذه الأعراض. للحصول على المزيد من المعلومات اسأل مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي الخاص بك.

اتصل بطبيبك للحصول على المشورة الطبية حول الأعراض الجانبية.

كيف يمكنني تخزين زيلجانز / زيلجانز إكس آر ؟

قم بتخزين زيلجانز / زيلجانز إكس آر في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

قم بالتخلص من الدواء المنتهي الصلاحية أو الذي لم تعد بحاجة إليه بطريقة آمنة.

احفظ زيلجانز / زيلجانز إكس آر وكل الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال

معلومات عامة حول الاستخدام الآمن والفعال لزيلجانز / زيلجانز إكس آر.

في بعض الأحيان توصف الأدوية لأغراض غير تلك الواردة بالدليل الدوائي. لا تستخدم زيلجانز / زيلجانز إكس آر لحالة لم يوصف لها. لا تتصح أشخاصاً آخرين باستخدام زيلجانز / زيلجانز إكس آر حتى إذا كانوا يعانون من نفس الأعراض التي تعاني منها. فقد يضرهم ذلك.

يوجز هذا الدليل الدوائي أهم المعلومات حول زيلجانز / زيلجانز إكس آر. إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. يمكنك أن تستفسر من الصيدلي أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن معلومات زيلجانز / زيلجانز إكس آر التي تستهدف متخصصي الرعاية الصحية.

ما هي العناصر المكونة لزيلجانز 5 مجم؟

المكون الفعال: سترات التوفاسيتينيب

المكونات غير الفعالة: كروسكارميلوز الصوديوم، و2910HPMC/هيبيروميلوز 6 سي.بي، ولاكتوز أحادي الهيدرات، وماكروجول/بولي إيثيلين جليكول 3350 (PEG)، وستيرات المغنسيوم، والسيليولوز البلوري المكروي، وثاني أكسيد التيتانيوم، وثلاثي الأسيتين.

ما هي العناصر المكونة لزيلجانز 10 مجم؟

المكون الفعال: سترات التوفاسيتينيب

المكونات غير الفعالة: كروسكارميلوز الصوديوم، وصبغة الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل الزرقاء رقم 1/صبغة ألومنيوم أزرق لامع FCF، وصبغة الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل الزرقاء رقم 2/صبغة ألومنيوم قرمزي نيلي، و2910HPMC/هيبروميلوز 6 سي.بي، ولاكتوز أحادي الهيدرات، وماكروجول/بولي إيثيلين جليكول 3350 (PEG)، وستيرات المغنسيوم، والسيليلوز البلوري المكروي، وثاني أكسيد التيتانيوم، وثلاثي الأسيتين.

ما هي العناصر المكونة لزيلجانز إكس آر 11 مجم؟

المكون الفعال: سترات التوفاسيتينيب

المكونات غير الفعالة: أسيتات السيليلوز، وكوبوفيدون، وهيدروكسي إيثيل السليلوز، وهيدروكسي بروبيل السليلوز، و2910HPMC/هيبروميلوز، وستيرات المغنسيوم، وأكسيد الحديد الأحمر، وسوربيتول، وثاني أكسيد التيتانيوم، وثلاثي الأسيتين. يحتوي حبر الطباعة على هيدروكسيد الألومنيوم، وأوكسيد الحديدوز الحديديك/الحديد الأسود، وجليكول البروبيلين، وصمغ اللك.

قد لا يتم طرح جميع التركيزات/ أحجام العبوات في الأسواق

مالك حق التسويق

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street, New York 10017, USA

الجهة المصنعة : زيلجانز أقراص 10 مجم :

Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Freiburg, Germany

إجازة التشغيلات لأقراص زيلجانز 10 مجم يتم من قبل:

Pfizer Pharmaceuticals LLC,
KM.1.9 Road 689, Vega Baja, Puerto Rico 00693, USA

تمت المراجعة بتاريخ: ديسمبر/كانون الأول 2019

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة الوصفة الطبية للطبيب، وطريقة الاستخدام بالإضافة إلى تعليمات الصيدلي الذي صرف لك الدواء.
- الطبيب والصيدلي خبيران في الأدوية ومنافعها والمخاطر المترتبة على تعاطيها.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف نفس الدواء بدون استشارة الطبيب.

احتفظ بجميع الأدوية بعيداً عن متناول وروية الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيدلة العرب