


Generic Name: Tioconazole  
Trade Name: TROSYD  
CDS Effective Date: September 3, 2008  
Supersedes: NA  
Approved by BPOM: August 21, 2020

Generic name: Tioconazole  
Trade Name: TROSYD  
CDS Effective Date: September 3, 2008  
Supersedes: NA

TROSYD<sup>®</sup> (tiokonazol) adalah derivat imidazol dengan nama kimia 1[2-[(2-kloro-3-tienil) metoksi]-2-(2,4-diklorofenil)etil]-1H-imidazol dan berat molekul 387,7. Struktur kimianya sebagai berikut :



Tiokonazol berbentuk kristal padat berwarna putih, sedikit larut dalam air, dan larut baik dalam metanol, etanol, dan kloroform.

#### CARA KERJA

TROSYD adalah obat anti jamur sintetik berspektrum luas. Aktivasinya mencakup beberapa kuman gram positif, seperti *Staphylococcus* dan *Streptococcus* spp. TROSYD *invitro* bersifat fungisidal terhadap dermatofit patogen, ragi dan fungus lain. Studi klinis menunjukkan bahwa TROSYD efektif untuk pengobatan semua infeksi dermatofit antropofilik dan zoofilik yang sering terjadi, terutama infeksi oleh *Trichophyton rubrum* dan *T. mentagrophytes*, kandidiasis dan pitiriasis versikolor.

Pemberian TROSYD mengurangi gejala-gejala infeksi kulit oleh jamur secara nyata dalam waktu beberapa hari pertama pengobatan. Absorpsi sistemik pada penggunaan di kulit dapat diabaikan. Pemberian TROSYD krim kulit pada tikus dan kelinci tidak menimbulkan toksisitas sistemik, hanya terdapat reaksi lokal yang ringan.

Generic Name: Tioconazole  
Trade Name: TROSYD  
CDS Effective Date: September 3, 2008  
Supersedes: NA  
Approved by BPOM: August 21, 2020

## **INDIKASI**

TROSYD digunakan untuk pengobatan topikal infeksi kulit yang disebabkan oleh fungus yang peka (dermatofit dan ragi). Infeksi seperti tinea pedis, tinea kruris, tinea korporis dan tinea unguium memberikan respons yang baik terhadap pengobatan dengan TROSYD.

## **KONTRAINDIKASI**

TROSYD dikontraindikasikan pada orang-orang yang hipersensitif terhadap obat-obat antifungus golongan imidazol atau terhadap komponen-komponen obat kulit.

## **PERINGATAN**

TROSYD obat kulit tidak boleh digunakan pada mata.

Kehamilan dan laktasi

Penggunaan selama kehamilan:

Absorpsi sistemik setelah diaplikasikan pada kulit dapat diabaikan. Belum ada penelitian yang adekuat dan terkontrol untuk wanita hamil. Tioconazole hanya digunakan pada masa kehamilan bila dokter percaya bahwa manfaat potensial melebihi risiko potensial untuk fetus.

Penggunaan selama laktasi:

Belum diketahui apakah obat ini diekskresikan dalam ASI. Menyusui harus dihentikan sementara ketika menggunakan obat ini.

## **EFEK SAMPING**

Pada pemakaian lokal di kulit, TROSYD ditoleransi dengan baik dan tidak menimbulkan reaksi sistemik. Gejala-gejala iritasi lokal pernah dilaporkan terjadi pada beberapa penderita. Gejala tersebut biasanya muncul pada minggu pertama pengobatan dan bersifat sementara dan ringan. Namun bila timbul reaksi hipersensitivitas pada penggunaan TROSYD, maka obat harus dihentikan dan diberikan terapi yang diperlukan.

Tubuh Secara Keseluruhan: Reaksi alergi (termasuk edema perifer, edema periorbital dan urtikaria)

Sistem Saraf Pusat dan Tepi: Parestesia

Kulit/ Lainnya: Erupsi bulosa, dermatitis, dermatitis kontak, kulit kering, kelainan kuku (termasuk perubahan warna kuku, inflamasi periungual dan nyeri pada kuku), ruam, eksfoliasi kulit, iritasi kulit.

Generic Name: Tioconazole  
Trade Name: TROSYD  
CDS Effective Date: September 3, 2008  
Supersedes: NA  
Approved by BPOM: August 21, 2020

## **OVERDOSIS**

Overdosis yang disebabkan aplikasi topikal tioconazole tidak disebabkan oleh absorpsi sistemik yang dapat diabaikan.

## **DOSIS DAN CARA PEMBERIAN**

TROSYD krim kulit 1% harus digosokkan dengan rata pada bagian kulit yang terkena infeksi dan sekitarnya sekali atau dua kali sehari, di pagi hari dan/atau di malam hari. Di daerah lipatan kulit, krim harus dioleskan tipis-tipis dan diratakan untuk menghindari efek maserasi.

Lama pengobatan untuk mencapai kesembuhan bervariasi antar penderita, tergantung dari organisme penyebab dan tempat yang terkena infeksi. Pengobatan selama 7 hari biasanya cukup untuk mencapai kesembuhan pada penderita dengan tinea versikolor, akan tetapi mungkin diperlukan sampai 6 minggu untuk kasus tinea pedis yang berat, terutama tipe hiperkeratorik kronik. Lama pengobatan yang diperlukan untuk infeksi dermatofit pada tempat-tempat lain, serta pada kandidiasis, biasanya antara 2 sampai 4 minggu.

## **KEMASAN**

TROSYD tersedia sebagai:

krim kulit 1% tube 10 gram - No. Reg ..... krim

kulit 1% tube 20 gram - No. Reg .....

**HARUS DENGAN RESEP DOKTER.**

**SIMPANLAH DI TEMPAT KERING DI BAWAH SUHU 25°C.**

Diproduksi oleh PT. Pfizer Indonesia, PO BOX 2706, Jakarta, Indonesia