

**IBUPIRAC**  
**IBUPROFENO**  
Suspensión al 2%

Venta Libre

Elaborado en Argentina

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.**

**¿QUÉ CONTIENE IBUPIRAC SUSPENSION?**

Cada 100 ml de Suspensión Sabor Naranja contiene:

IBUPROFENO 2 g

Excipientes: Azúcar 30 g, Sacarina sódica 100 mg, Ciclamato de sodio 300 mg, Glicirricinato de amonio 200 mg, Carboximetilcelulosa sódica 800 mg, Dióxido de silicio coloidal 500 mg, Amarillo Ocaso 10 mg, Esencia líquida de naranja 2 ml, Polisorbato 20 500 mg, Metilparabeno sódico 200 mg, Propilparabeno sódico 30 mg, Agua purificada c.s.p. 100 ml

Cada 100 ml de Suspensión Sabor Ananá contiene:

IBUPROFENO 2 g

Excipientes: Azúcar 30 g, Ciclamato de sodio 300 mg, Sacarina sódica 100 mg, Glicirricinato de amonio 200 mg, Carboximetilcelulosa sódica 600 500 mg, Avicel RC-591 1,25 g, Sorbitol 70% 20 g, Lauril sulfato de sodio 20 mg, Emulsión de simeticona al 30% 200 mg, Metilparabeno sódico 200 mg, Propilparabeno sódico 30 mg, Amarillo de Quinoleína soluble 0,10 mg, Esencia de ananá 0,25 ml, Agua purificada c.s.p. 100 ml

**ACCIONES**

**Calma el dolor, reduce la inflamación y baja la fiebre.**

**¿PARA QUE SE USA IBUPIRAC SUSPENSION?**

IBUPIRAC SUSPENSION se usa para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, de dientes y de cabeza, para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

**¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR IBUPIRAC SUSPENSION?**

NO USE este medicamento si usted es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios similares o a algún componente del medicamento.

NO USE este medicamento si usted padece de enfermedad del hígado, riñones o corazón.

NO USE este medicamento si usted está tomando otros productos que contienen ibuprofeno u otros antiinflamatorios.

NO USE este medicamento si usted tiene o ha tenido úlcera en el estómago.

**¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

Debe ser tomada la menor dosis por el período de tiempo más corto necesario para aliviar sus síntomas. Tenga especial precaución y consulte con su médico antes de utilizar este medicamento si:

- El niño se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier otra medicación, presenta problemas o efectos colaterales severos al emplear antitérmicos o antialérgicos, está deshidratado (pérdida de líquidos significativa) debido a vómitos continuos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.
- En el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción.
- El dolor de garganta es severo, dura más de 2 días con igual intensidad o se presenta con fiebre, dolor de cabeza, erupción, náuseas y/o vómitos.
- Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos, excepto bajo supervisión médica.
- Tiene asma o alergia.
- Tiene problemas circulatorios.
- Tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez).
- Es mayor de 65 años.

Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Los analgésicos antiinflamatorios, a excepción de la aspirina, aumentan el riesgo de ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular, los cuales pueden llevar a la muerte. El riesgo es mayor si las dosis usadas son mayores a las indicadas o si son usadas por más tiempo que el indicado.

Hable con su médico o farmacéutico si:

- Usted tiene una infección (por favor lea bajo del subtítulo “Infecciones”).
- Usted toma aspirina para protegerse contra un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, ya que el ibuprofeno puede reducir el beneficio de la aspirina.

Infecciones:

Ibupirac puede esconder los signos de infecciones como la fiebre y el dolor. Por lo tanto es posible que Ibupirac pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias e infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si usted toma este medicamento mientras sufre una infección y

los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.

### ¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Consulte a su médico si el niño no obtiene alivio en el término de 1 día (24 horas) de tratamiento, o el dolor o la fiebre empeoran o aparecen nuevos síntomas.

No utilizar:

- durante más de 3 días contra la fiebre y 5 días para el dolor.
- contra el dolor de estómago.

En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, malestar abdominal), erupción cutánea, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigo y dolor de cabeza.

Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las transaminasas (enzimas hepáticas), oliguria (retención de orina) y/o agranulocitosis (disminución de un tipo de glóbulo blanco).

Busque atención médica inmediata si experimenta síntomas tales como:

- Dolor de pecho
- Falta de aire o problemas al respirar
- Debilidad súbita o entumecimiento en una parte o un lado del cuerpo
- Dificultad súbita para hablar

### ¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Agite el frasco antes de usar IBUPIRAC SUSPENSIÓN.

IBUPIRAC SUSPENSIÓN se debe administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla, de ser posible elija la dosis según el peso, en caso contrario elija según la edad. En niños con problemas estomacales se recomienda ingerir este producto con la comida.

#### Tabla de dosificación

Peso del niño	Edad aproximada según peso	Temperatura mayor o igual a 38 grados axilar
Menos de 11 kg	Menos de 2 años	Consulte con su médico
11 a 15 kg	2 a 3 años	5 ml
16 a 21 kg	4 a 5 años	7,5 ml
21 a 27 kg	6 a 8 años	10 ml
27 a 32 kg	9 a 10 años	12,5 ml
Más de 32 kg	Más de 10 años	15 ml

En caso necesario repita la dosis cada 8 horas. No administre más de 3 veces por día.

Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Si usted tiene una infección, consulte a un médico sin demora si los síntomas (como fiebre y dolor) persisten o empeoran.

**¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOME MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?**

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

**¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?**

Para mayor información respecto al producto comuníquese al teléfono 0800 266 7902 o al teléfono de ANMAT Responde 0800-333-1234.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

No utilizar después de la fecha de vencimiento

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

**CONSERVACIÓN**

Conservar en lugar seco y fresco, a temperatura no superior a 25° C.

**PRESENTACIÓN**

Envases que contienen 110 ml de suspensión.

Medicamento libre de gluten.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - Certificado N° 35.918

PFIZER S.R.L.

Carlos Berg 3669, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Directora Técnica: Farmacéutica María Cecilia Lezcano

Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: .../.../...