

**IBUPIRAC**  
**IBUPROFENO 400 mg**  
Comprimidos

Industria Argentina

Venta Libre

**COMPOSICIÓN**

Cada comprimido contiene:

Ibuprofeno 400 mg

Excipientes: Aerosil, Lactosa, Avicel, Ac-Di-Sol, Estearato de Magnesio.

**ACCIÓN TERAPÉUTICA**

**Analgésico, antiinflamatorio y antifebril.**

**USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN**

**INDICACIONES**

Ibupirac está indicado para el alivio sintomático de:

- Dolores musculares
- Dolores de espalda
- Fiebre
- Dolores de cabeza
- Dolor asociado a los estados gripales
- Dolores menstruales
- Dolores de dientes
- Dolores producidos por artritis

**COMO USAR ESTE MEDICAMENTO**

Adultos y niños mayores de 15 años: 1 comprimido cada 6 a 8 horas mientras los síntomas persistan.

La dosis diaria no debe superar los 3 comprimidos (1200 mg/día).

Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.

Mayores de 65 años: consulte a su médico.

Niños menores de 15 años: consulte con su médico.

**CONTRAINDICACIONES**

Alergia al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Insuficiencia hepática y renal.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o por más de 3 días para la disminución de la fiebre. Si los síntomas continúan o aparece cualquier otro síntoma nuevo, si el dolor o la fiebre continúan o empeoran o si el área dolorida está roja o hinchada, deberá consultar a su médico.

Consulte al médico antes de tomar ibuprofeno si Ud. sufre de hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca, enfermedades del hígado o riñón o de úlcera gástrica o duodenal.

Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.

Si Ud. consume 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

La ingesta de ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.

**Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.**

***Si Ud. padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc., deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.***

**Interacciones con otros medicamentos:**

Si Ud. ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

**REACCIONES ADVERSAS**

Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

**SOBREDOSIFICACIÓN**

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

**CONSERVACION**

Conservar en lugar seco y fresco, a temperatura no superior a 25°C.

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
NO UTILIZAR DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/ O FARMACEUTICO**

**PRESENTACION**

Ibupirac 400: Envases con 10, 20, 50 y 100 comprimidos.

E.M.A.M.S. Cert. N° 35.918

PFIZER S.R.L.

Virrey Loreto 2477, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Directora Técnica: Sandra B. Maza - Farmacéutica.

Fecha última revisión: Diciembre 2007

Para mayor información respecto al producto, comunicarse al teléfono: (011) 4788-7000