

IBUPIRAC
IBUPROFENO 400 mg
Cápsulas blandas

Industria Brasileña

Venta Libre

COMPOSICIÓN

Cada cápsula blanda contiene:

Ibuprofeno 400 mg

Excipientes: Polietilenglicol 400 364 mg, Glicerina 103,3 mg, Hidróxido de potasio 50 mg, Polivinilpirrolidona K-30 30 mg, Gelatina 239,94 mg, Metilparabeno 0,837 mg, Propilparabeno 0,1674 mg, Sorbitol 55,8 mg, Colorante FD&C azul n° 1 0,0038 mg, Colorante rojo n° 2 0,038 mg, Agua purificada 94,4 mg.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Analgésico, antiinflamatorio y antifebril.

USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN

INDICACIONES

Ibupirac está indicado para el alivio sintomático de:

- Dolores musculares
- Dolores de espalda
- Fiebre
- Dolores de cabeza
- Dolor asociado a los estados gripales
- Dolores menstruales
- Dolores de dientes
- Dolores producidos por artritis

COMO USAR ESTE MEDICAMENTO

Adultos y niños mayores de 15 años: 1 cápsula blanda cada 6 a 8 horas mientras los síntomas persistan.

La dosis diaria no debe superar las 3 cápsulas blandas (1200 mg/día).

Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.

Mayores de 65 años: consulte a su médico.

Niños menores de 15 años: consulte con su médico.

CONTRAINDICACIONES

Alergia al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Insuficiencia hepática y renal.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o por más de 3 días para la disminución de la fiebre. Si los síntomas continúan o aparece cualquier otro síntoma nuevo, si el dolor o la fiebre continúan o empeoran o si el área dolorida está roja o hinchada, deberá consultar a su médico.

Consulte al médico antes de tomar ibuprofeno si Ud. sufre de hipertensión arterial y/ o insuficiencia cardíaca, enfermedades del hígado o riñón o de úlcera gástrica o duodenal.

Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.

Si Ud. consume 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

La ingesta de ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si Ud. padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc., deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

Interacciones con otros medicamentos:

Si Ud. ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

REACCIONES ADVERSAS

Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

CONSERVACION

Conservar en lugar seco y fresco, a temperatura no superior a 25°C.

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
NO UTILIZAR DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/ O FARMACEUTICO**

PRESENTACION

Envases con 10, 20 y 50 cápsulas blandas.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 35.918

PFIZER S.R.L.

Virrey Loreto 2477, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Directora Técnica: Sandra B. Maza - Farmacéutica.

Fecha última revisión: Septiembre 2009

Para mayor información respecto al producto, comunicarse al teléfono: (011) 4788-7000