

IBUPIRAC
IBUPROFENO 400 mg
Cápsulas blandas

Venta Libre

Elaborado en Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE IBUPIRAC?

Cada cápsula blanda contiene:

Ingrediente activo: Ibuprofeno 400 mg.

Ingredientes inactivos: Polietilenglicol 400 260 mg, Solución de Hidróxido de potasio al 50% 80 mg, Gelatina 216,5 mg, Solución Sorbitol-Sorbitan 123,5 mg, Colorante Azul FD&C n°1 0,005 mg, Colorante Rojo n°33 0,050 mg, Metilparabeno 0,75 mg, Propilparabeno 0,15 mg, Agua purificada 19,1 mg.

ACCIONES

Analgésico (calma el dolor) - antiinflamatorio (reduce la inflamación) - antifebril (baja la fiebre).

¿PARA QUÉ SE USA IBUPIRAC?

Ibupirac se utiliza para el alivio sintomático de dolores musculares, dolores de espalda, fiebre, dolores de cabeza, dolor asociado a los estados gripales, dolores menstruales, dolores de dientes, dolores producidos por artritis.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR IBUPIRAC?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios o a otros ingredientes del producto. Las reacciones que indican alergia pueden ser: erupción cutánea con picazón.

NO USE este medicamento si usted está tomando otros medicamentos que contienen ibuprofeno u otros antiinflamatorios.

NO USE este medicamento si usted padece de enfermedad del hígado, riñones o corazón.

NO USE este medicamento si usted tiene o ha tenido úlcera o hemorragia en el estómago, sangrado gastrointestinal o perforación, o enfermedades inflamatorias intestinales. Si vomita sangre. Si presenta heces negras o diarrea con sangre.

NO USE este medicamento si padece deshidratación grave (causada por vómitos, diarrea o ingesta de líquidos insuficientes).

NO USE este medicamento si padece trastornos hemorrágicos o de la coagulación sanguínea, o está tomando anticoagulantes (medicamentos utilizados para "fluidificar" la sangre).

NO USE este medicamento en niños menores de 12 años.

NO USE este medicamento si se encuentra cursando el tercer trimestre del embarazo.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o por más de 3 días para la disminución de la fiebre. Si los síntomas continúan o aparece cualquier otro síntoma nuevo, si el dolor o la fiebre continúan o empeoran o si el área dolorida está roja o hinchada, deberá consultar a su médico.

Consulte al médico antes de tomar ibuprofeno si usted:

- es mayor de 65 años,
- tiene asma o alergia,
- tiene presión arterial alta,
- tiene enfermedades del corazón, riñones o hígado,
- tiene problemas circulatorios,
- tiene edema (retención de líquidos),
- tiene síntomas de deshidratación,

- tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez), si ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación en el estómago, pudiéndose manifestar por un dolor abdominal intenso o persistente y/o por heces de color negro, o incluso sin síntomas previos de alerta,
- consume tres (3) o más vasos diarios de bebida alcohólica,
- está tomando algún otro medicamento, o está embarazada o dando del pecho a su bebé,
- sufre dolores de cabeza luego de un tratamiento prolongado, no debe tomar una dosis más alta del medicamento.

Los analgésicos antiinflamatorios, a excepción de la aspirina, aumentan el riesgo de ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular, los cuales pueden llevar a la muerte. El riesgo es mayor si las dosis usadas son mayores a las indicadas o si son usadas por más tiempo que el indicado.

Hable con su médico o farmacéutico si:

- Usted tiene una infección (por favor lea bajo del subtítulo “Infecciones”).
- Usted toma aspirina para protegerse contra un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, ya que el ibuprofeno puede reducir el beneficio de la aspirina.

Reacciones de la piel

Se han notificado reacciones cutáneas graves asociadas al tratamiento con este medicamento. Deje de tomar este medicamento y acuda al médico inmediatamente si presenta cualquier erupción cutánea, lesiones en las membranas mucosas, ampollas u otros signos de alergia, ya que éstos pueden ser los primeros signos de una reacción cutánea muy grave.

Niños y adolescentes

Existe un riesgo de daño renal en niños y adolescentes deshidratados

Precauciones durante el embarazo y las mujeres en edad fértil

Debido a que la administración de medicamentos del tipo ibuprofeno se ha asociado a un aumento del riesgo de sufrir anomalías congénitas/abortos no se recomienda la administración del mismo durante el primer y segundo trimestre del embarazo salvo que se considere estrictamente necesario. En estos casos la dosis y duración se limitará al mínimo posible.

En el tercer trimestre la administración de este medicamento está contraindicada.

Se recomienda no tomar ibuprofeno en períodos prolongados durante la lactancia.

Infecciones

Ibupirac puede esconder los signos de infecciones como la fiebre y el dolor. Por lo tanto es posible que Ibupirac pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias e infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si usted toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Vía de administración oral.

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 cápsula blanda cada 6 a 8 horas. Mientras los síntomas persistan el intervalo mínimo entre dosis puede ser de 6 horas, sin exceder la dosis máxima de 3 cápsulas blandas por día (1200 mg/día).

Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.

Mayores de 65 años: consulte a su médico.

No usar en niños menores de 12 años.

No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o por más de 3 días para la disminución de la fiebre. Si los síntomas persisten o empeoran por más de 48/72 horas, consulte a su médico.

Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Si usted tiene una infección, consulte a un médico sin demora si los síntomas (como fiebre y dolor) persisten o empeoran.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Si usted presenta alergias como erupción en la piel y picazón, que puede acompañarse de dificultad para respirar, hinchazón de labios, lengua, garganta o cara o si experimenta empeoramiento de su asma, suspenda su uso y consulte inmediatamente con su médico.

Este medicamento puede producir náuseas, acidez, dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal. Si ocurre esto consulte a su médico y suspenda su uso.

Busque atención médica inmediata si experimenta síntomas tales como:

- Dolor de pecho.
- Falta de aire o problemas al respirar.
- Debilidad súbita o entumecimiento en una parte o un lado del cuerpo.
- Dificultad súbita para hablar.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica, normalmente, los síntomas de sobredosis se producen transcurridas de 4 a 6 horas tras la toma de ibuprofeno.

Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Para mayor información respecto al producto comuníquese al teléfono 0800 266 7902 o al teléfono de ANMAT Responde 0800-333-1234.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No utilizar después de la fecha de vencimiento.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco y fresco, a temperatura no superior a 25°C.

PRESENTACIÓN

Envases con 12, 24 y 60 cápsulas blandas.

Medicamento libre de gluten.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 35.918

Elaborado en PFIZER S.R.L., Carlos Berg 3669, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Directora Técnica: María Cecilia Lezcano - Farmacéutica.

Fecha última revisión: .../.../...