

金黴素外用軟膏 30 毫克/公克 (氯四環素)

Aureomycin Ointment 30mg/g (Chlortetracycline)

衛署藥製字第 042105 號

金黴素外用軟膏，以羊毛脂、石蠟為基質，每公克中含有鹽酸氯四環素 30 毫克。金黴素是用途最廣的抗生素之一，為多種革蘭氏陽性菌、革蘭氏陰性菌、以及立克次氏體屬（斑疹傷寒病原體）、濾過性病毒和類似濾過性病毒的感染，均有效。本軟膏係專供局部外用。

成分

有效成分及含量：每公克中含有鹽酸氯四環素 30 毫克。

其他成分(賦形劑): Lanolin anhydrous、white petrolatum 及 mineral oil light。

用途(適應症)

急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染。

使用上注意事項

有下列情形者，請勿使用

- 曾因本藥成分引起過敏的人。

有下列情形者，使用前請洽醫師診治

- 使用於大面積之體表或皮膚深部感染。

有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

- 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

其他使用上注意事項

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼的地方。
3. 勿超過建議使用量。
4. 塗抹本藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
5. 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得使用於眼睛四周或黏膜。
6. 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。
7. 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。
8. 使用抗生素，有時可能導致人體內某些對抗生素無感應性的微生物過分繁殖，故必須隨時注意患者。在治療期間，如果發現新的感染，應採取適當措施。
9. 長期使用本藥，有可能引起繼發性感染(在抵抗力減弱的情形下，被另一種新的病菌感染)。
10. 如果本藥膏沾染衣物，可用市售清潔劑高溫洗滌，即可去除污漬。

用法和用量

次數	每日 2~4 次，或依病情需要縮短塗用間隔時間。
----	--------------------------

方式	塗於患部。遇嚴重或頑強感染須連續使用多日，或同時口服鹽酸氯四環素膠囊以加強治療效果。對輕微感染，在四十八小時內即可見效。
----	--

警 語

服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

部位	副作用
皮膚	過敏性皮膚炎、繼發性感染、固定型藥物疹

服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- 使用後自覺狀況未改善或更惡化。

類 別：醫師藥師藥劑生指示藥品。

貯 存：貯存於 25°C 以下。

包 裝：5 公克軟管裝。

委 託 者：輝瑞大藥廠股份有限公司

地 址：台北市信義區松仁路 100 號 42、43 樓

製 造 廠：聯亞藥業股份有限公司新竹廠

廠 址：新竹縣湖口鄉光復北路 45 號

版本：MoH 20160308-4