

ソル・コーテフ静注用250mg
 ソル・コーテフ静注用500mg
 ソル・コーテフ静注用1000mg

【この薬は？】

販売名	ソル・コーテフ静注用250mg Solu-Cortef for Intravenous Use 250mg	ソル・コーテフ静注用500mg Solu-Cortef for Intravenous Use 500mg	ソル・コーテフ静注用1000mg Solu-Cortef for Intravenous Use 1000mg
一般名	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム Hydrocortisone Sodium Succinate		
含有量 (1バイアル (下部)中)	334mg (ヒドロコルチゾン相当量 250mg)	668mg (ヒドロコルチゾン相当量 500mg)	1337mg (ヒドロコルチゾン相当量 1000mg)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、副腎皮質ホルモン剤（ステロイド）と呼ばれるグループに属する注射薬です。
- ・この薬は、炎症やアレルギー症状を改善したり、免疫を抑制するなどさまざま

な働きがあり、多くの病気に用いられます。ただし、病気の原因そのものを治す薬ではありません。

- ・次の病気または次の目的で、医療機関で使用されます。

〈ソル・コーテフ静注用250mg、500mg、1000mg〉

急性循環不全（出血性ショック、外傷性ショック）及びショック様状態における救急

〈ソル・コーテフ静注用250mg、500mg〉

気管支喘息

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にソル・コーテフ静注用に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・デスマプレシン酢酸塩水和物（ミニリンメルト）を夜間多尿による夜間頻尿に使用している男性

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・感染症にかかっている人
- ・全身の真菌症にかかっている人
- ・急性心筋梗塞をおこした人
- ・消化性潰瘍、憩室炎の人
- ・糖尿病の人
- ・結核にかかっている人
- ・単純疱疹性角膜炎の人
- ・骨粗鬆症の人
- ・精神病の人
- ・後囊白内障の人
- ・緑内障の人
- ・高血圧症、うっ血性心不全の人
- ・電解質異常のある人
- ・甲状腺機能が低下している人
- ・脂肪肝、脂肪塞栓症の人
- ・血栓症の人
- ・重症筋無力症の人
- ・気管支喘息の人
- ・最近、内臓の手術を受けた人
- ・潰瘍性大腸炎（切迫穿孔、膿瘍、他の化膿性感染症の疑いがある場合）の人
- ・B型肝炎ウイルスキャリアの人
- ・腎不全の人
- ・肝硬変の人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

[併用してはいけない薬]

生ワクチンまたは弱毒生ワクチン（この薬を免疫抑制がおこる量で使用している場合）：乾燥弱毒生麻疹ワクチン、乾燥弱毒生風疹ワクチン、乾燥BCGワクチン等

デスマプレシン酢酸塩水和物（男性における夜間多尿による夜間頻尿に使用している場合）：ミニリンメルト

【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

●使用量および回数

使用量、使用回数、使用方法などは、あなたの症状などにあわせて、医師が決め、医療機関において注射されます。

通常の使用量および回数は、次のとおりです。

使用される病気または目的	使用量および回数
急性循環不全（出血性ショック、外傷性ショック）及びショック様状態における救急	ヒドロコルチゾンとして1回250～1000mg
気管支喘息	成人：ヒドロコルチゾンとして初回量100～500mg。その後、症状が改善しない場合には、50～200mgを4～6時間ごとに追加。
	2歳以上の小児：ヒドロコルチゾンとして初回量体重1kgあたり5～7mg。その後、症状が改善しない場合には、体重1kgあたり5～7mgを6時間ごとに追加。
	2歳未満の小児：ヒドロコルチゾンとして初回量体重1kgあたり5mg。その後、症状が改善しない場合には、体重1kgあたり5mgを6～8時間ごとに追加。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を連用した後、急に使用を中止すると、発熱、頭痛、食欲不振、脱力感、筋肉痛、関節痛、ショックなどがあらわれることがあります。中止する場合は徐々に減量されます。医師の指示どおりに使用してください。
- ・B型肝炎ウイルスキャリアの人は、この薬の使用後や使用終了後に継続して血液検査が行われます。B型肝炎ウイルスの増殖による肝炎（発熱、体がだるい、吐き気、嘔吐（おうと）、食欲不振、上腹部痛、皮膚や白目が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる）があらわれることがあるので、症状があらわれた場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・水痘（みずぼうそう）または麻疹（はしか）に感染すると、致命的な経過をたどることがあります。感染が疑われる場合はただちに受診してください。
- ・連用により眼圧亢進、緑内障、後嚢白内障になることがあるので、定期的に検査が行われることがあります。
- ・リンパ系腫瘍のある人にヒドロコルチゾン製剤（注射剤）を使用した際に腫瘍

崩壊症候群（意識の低下、意識の消失、尿量が減る、息苦しい、息切れ）があらわれたとの報告があるので、これらの症状があらわれた場合には、速やかに医師に連絡してください。

- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用する可能性があることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失
感染症 かんせんしょう	発熱、寒気、体がだるい
続発性副腎皮質機能不全 ぞくはつせいふくじんひし つきのうふぜん	体がだるい、意識の低下、意識の消失、嘔吐、食欲不振、発熱、冷汗が出る、顔面蒼白、手足が冷たくなる
骨粗鬆症 こつそしょうしょう	骨折しやすい、腰・背中の痛み、手足の痛み、背が低くなった、背中が丸くなった
骨頭無菌性壊死 こつとうむきんせいえし	脚の付け根の痛み、膝からももへの痛み、腕の付け根の痛み
胃腸穿孔 いちょうせんこう	激しい腹痛、吐き気、嘔吐、寒気、発熱、ふらつき、息切れ、意識の低下
消化管出血 しょうかかんしゅつけつ	吐き気、嘔吐、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色または黒褐色）、腹痛、便に血が混じる、黒い便が出る
消化性潰瘍 しょうかせいかいよう	吐き気、嘔吐、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色ときに黒色）、腹痛、胃がむかむかする、黒い便が出る
ミオパチー	筋肉の痛み、筋肉のこわばり、筋力の低下、筋萎縮
血栓症 けっせんしょう	ふくらはぎの痛み・腫れ、手足のしびれ、鋭い胸の痛み、突然の息切れ、押しつぶされるような胸の痛み、激しい頭痛、脱力、まひ、めまい、失神、目のかすみ、舌のもつれ、しゃべりにくい
頭蓋内圧亢進 とうがいないあつこうしん	けいれん、意識の低下、頭痛、嘔吐
痙攣 けいれん	顔や手足の筋肉がぴくつく、一時的にボーっとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える
精神変調 せいしんへんちよう	普段とは違う精神状態、幻覚、妄想、興奮抑うつ


重大な副作用	主な自覚症状
うつ状態 うつじょうたい	気分がゆううつになる、悲観的になる、思考力の低下、不眠、食欲不振、体がだるい
糖尿病 とうようびょう	体がだるい、体重が減る、喉が渇く、水を多く飲む、尿量が増える
緑内障 りょくないしょう	目のかすみ、視力の低下、視野が欠けて狭くなる
後囊白内障 こうのうはくないしょう	視力の低下、かすんで見える、まぶしい、眼鏡で視力が出ない
気管支喘息 きかんしぜんそく	息をするときゼーゼー鳴る、息をするときヒューヒューと音がする、息苦しい
心破裂 しんはれつ	気を失う、胸の痛み
うつ血性心不全 うつけつせいしんふぜん	息苦しい、息切れ、疲れやすい、むくみ、体重の増加
食道炎 しょくどうえん	胸やけ、すっぱいものが上がってくる
カポジ肉腫 カポジにくしゅ	紫～褐色の消えないあざ、しこり、痛みを伴うあざ、しこり
腱断裂 けんだんれつ	アキレス腱の痛み、歩行障害、注射した指の関節を曲げにくい、注射した指の関節を伸ばしにくい、注射した指の関節が曲がらない
心停止 しんていし	気を失う
循環性虚脱 じゅんかんせいきょだつ	冷汗が出る、顔面蒼白、脱力感、ふらつき、立ちくらみ、意識の消失、めまい
不整脈 ふせいみやく	めまい、動悸（どうき）、脈が遅くなる、気を失う、脈がとぶ

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷汗が出る、発熱、寒気、体がだるい、骨折しやすい、背が低くなった、ふらつき、脱力、まひ、けいれん、顔や手足の筋肉がびくつく、体重が減る、疲れやすい、むくみ、体重の増加、脱力感
頭部	めまい、意識の消失、意識の低下、激しい頭痛、失神、頭痛、一時的にボーっとする、普段とは違う精神状態、幻覚、妄想、興奮抑うつ、気分がゆううつになる、悲観的になる、思考力の低下、不眠、気を失う、立ちくらみ
顔面	顔面蒼白
眼	目のかすみ、視力の低下、視野が欠けて狭くなる、かすんで見える、まぶしい、眼鏡で視力が出ない

部位	自覚症状
口や喉	嘔吐、吐き気、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色または黒褐色）、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色ときに黒色）、舌のもつれ、しゃべりにくい、喉が渇く、水を多く飲む、息をするときゼーゼー鳴る
胸部	息切れ、鋭い胸の痛み、突然の息切れ、押しつぶされるような胸の痛み、息をするときヒューヒューと音がする、息苦しい、胸の痛み、胸やけ、すっぱいものが上がってくる、動悸
腹部	食欲不振、激しい腹痛、腹痛、胃がむかむかする
背中	腰・背中での痛み、背中が丸くなった
手・足	手足が冷たくなる、手足の痛み、脚の付け根の痛み、膝からももへの痛み、腕の付け根の痛み、ふくらはぎの痛み・腫れ、手足のしびれ、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える、アキレス腱の痛み、歩行障害、注射した指の関節を曲げにくい、注射した指の関節を伸ばしにくい、注射した指の関節が曲がらない、脈が遅くなる、脈がとぶ
皮膚	紫～褐色の消えないあざ、しこり、痛みを伴うあざ、しこり
筋肉	筋肉の痛み、筋肉のこわばり、筋力の低下、筋萎縮
便	便に血が混じる、黒い便が出る
尿	尿量が増える

【この薬の形は？】

販売名	ソル・コーテフ 静注用 250mg	ソル・コーテフ 静注用 500mg	ソル・コーテフ 静注用 1000mg
性状	白色の粉末で、バイアル上下部を混和し溶かした注射液は、無色または微黄色澄明		
形状			
溶解液 (バイアル上部)	注射用水 2 mL	注射用水 4 mL	注射用水 8 mL

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ソル・コーテフ静 注用250mg	ソル・コーテフ静 注用500mg	ソル・コーテフ静 注用1000mg
有効成分	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム		
添加剤	無水リン酸一水素ナトリウム 無水リン酸二水素ナトリウム pH調節剤		

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ファイザー株式会社

(<https://www.pfizer.co.jp/pfizer/>)

製品情報センター（患者さん・一般の方）

電話：0120-965-485

FAX：03-3379-3053

受付時間：月～金 9時～17時30分

（土日祝祭日および弊社休業日を除く）