

サイトテック錠 100、サイトテック錠 200

【この薬は？】

販売名	サイトテック錠 100 Cytotec Tablets 100	サイトテック錠 200 Cytotec Tablets 200
一般名	ミソプロストール Misoprostol	
含有量 (1錠中)	100 μ g	200 μ g

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、消化性潰瘍用剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、胃酸の分泌を抑え、胃粘膜を保護する働きがあります。
- ・次の病気の人に処方されます。

非ステロイド性消炎鎮痛剤の長期投与時にみられる胃潰瘍及び十二指腸潰瘍

- ・この薬は、原則として非ステロイド性消炎鎮痛剤を3ヵ月以上長期に飲む必要がある関節炎のある人などでの、胃潰瘍および十二指腸潰瘍の治療の場合に限り医師の判断により処方されます。
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・過去にプロスタグランジン製剤で過敏症のあった人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・脳血管の障害や心臓の血管の病気などがある人
- ・肝臓に障害がある人
- ・妊娠する可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

販売名	サイトテック錠 100	サイトテック錠 200
一回量	2錠	1錠
飲む回数	1日4回	1日4回

- ・この薬は、毎食後および就寝前に飲みます。

●どのように飲むか？

- ・コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

- ・決して2回分を一度に飲んではいけません。
- ・1回とばして次の食事または就寝前まで待つて1回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

- ・次の症状があらわれる可能性があります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、医師に連絡してください。

鎮静、振戦（手足のふるえ、首のふるえ）、けいれん、呼吸困難（息苦しい、息切れ）、腹痛、下痢、発熱、心悸亢進（動悸（どうき）、脈が速くなる）、低血圧（脱力感、めまい等）、徐脈（立ちくらみ、脈が遅くなる等）

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬は子宮に対する収縮作用があり、妊娠中に飲むと流産を起こすおそれがあります。
- ・妊娠する可能性のある人がこの薬を使用する場合、妊娠しないよう、使用中は確実に避妊をしてください。
この薬を使用中に妊娠が疑われた場合は、ただちに使用を中止し、医師を受診してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使用することはできません。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・この薬を使用すると下痢が起こることがあります。通常は軽くて一時的なも

のですが、症状が続く場合は医師に相談してください。また、マグネシウム含有制酸剤を併用すると、下痢が起こりやすくなりますので注意してください。

- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？



特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。



重大な副作用	主な自覚症状
ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷汗が出る、ふらつき
頭部	めまい、意識の消失
顔面	顔面蒼白
口や喉	喉のかゆみ
胸部	動悸、息苦しい
手・足	手足が冷たくなる
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹

【この薬の形は？】

販売名	サイトテック錠 100	サイトテック錠 200
PTP シート		

販売名	サイトテック錠 100	サイトテック錠 200
形状	素錠 	割線入り素錠 
直径	7.2 mm	長径 9.2 mm、短径 8.4 mm
厚さ	2.5 mm	3.5 mm
重さ	0.1 g	0.2 g
色	白色	白色
識別コード	SEARLE 110	SEARLE 111

【この薬に含まれているのは？】

販売名	サイトテック錠 100	サイトテック錠 200
有効成分	ミソプロストール	
添加剤	デンプングリコール酸ナトリウム、結晶セルロース、硬化油、ヒプロメロース	

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かない所に保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状や使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ファイザー株式会社

(<https://www.pfizer.co.jp/pfizer/>)

メディカル・インフォメーション（患者さん・一般の方）

電話：0120-965-485

受付時間：月～金 9時～17時30分

（土日祝日および弊社休業日を除く）