

**IBUPIRAC**  
**IBUPROFENO**  
Suspensión al 2%

Venta Libre

Elaborado en Argentina

**¿QUÉ CONTIENE IBUPIRAC SUSPENSION?**

Cada 100 ml de Suspensión Sabor Naranja contiene:

IBUPROFENO 2 g

Excipientes: Azúcar, Sacarina sódica, Ciclamato de sodio, Glicirricinato de amonio, Carboximetilcelulosa sódica, Dióxido de silicio coloidal, Amarillo Ocaso, Esencia líquida de naranja, Polisorbato 20, Metilparabeno sódico, Propilparabeno sódico, Agua purificada c.s.

Cada 100 ml de Suspensión Sabor Ananá contiene:

IBUPROFENO 2 g

Excipientes: Azúcar, Ciclamato de sodio, Sacarina sódica, Glicirricinato de amonio, Carboximetilcelulosa sódica 600, Avicel RC-591, Sorbitol 70%, Lauril sulfato de sodio, Emulsión de simeticona al 30%, Metilparabeno sódico, Propilparabeno sódico, Amarillo de Quinoleína soluble, Esencia de ananá, Agua purificada c.s.

**ACCIONES**

**Calma el dolor, reduce la inflamación y baja la fiebre.**

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.**

**¿PARA QUE SE USA IBUPIRAC SUSPENSION?**

IBUPIRAC SUSPENSION se usa para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, de dientes y de cabeza, para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

**¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR IBUPIRAC SUSPENSION?**

NO USE este medicamento si usted es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios similares o a algún componente del medicamento.

NO USE este medicamento si usted padece de enfermedad del hígado, riñones o corazón.

NO USE este medicamento si usted está tomando otros productos que contienen ibuprofeno u otros antiinflamatorios.

NO USE este medicamento si usted tiene o ha tenido úlcera en el estómago.

**¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

Debe ser tomada la menor dosis por el período de tiempo más corto necesario para aliviar sus síntomas. Tenga especial precaución y consulte con su médico antes de utilizar este medicamento si:

- El niño se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier otra medicación, presenta problemas o efectos colaterales severos al emplear antitérmicos o antialérgicos, está deshidratado (pérdida de líquidos significativa) debido a vómitos continuos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.
- En el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción.
- El dolor de garganta es severo, dura más de 2 días con igual intensidad o se presenta con fiebre, dolor de cabeza, erupción, náuseas y/o vómitos.
- Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos, excepto bajo supervisión médica.
- Tiene asma o alergia.
- Tiene problemas circulatorios.
- Tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez).
- Es mayor de 65 años.

Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

**¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?**

Consulte a su médico si el niño no obtiene alivio en el término de 1 día (24 horas) de tratamiento, o el dolor o la fiebre empeoran o aparecen nuevos síntomas.

No utilizar:

- durante más de 3 días contra la fiebre y 5 días para el dolor.
- contra el dolor de estómago.

En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, malestar abdominal), erupción cutánea, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigo y dolor de cabeza.

Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las transaminasas (enzimas hepáticas), oliguria (retención de orina) y/o agranulocitosis (disminución de un tipo de glóbulo blanco).

#### **¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?**

Agite el frasco antes de usar IBUPIRAC SUSPENSIÓN.

IBUPIRAC SUSPENSIÓN se debe administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla, de ser posible elija la dosis según el peso, en caso contrario elija según la edad. En niños con problemas estomacales se recomienda ingerir este producto con la comida.

#### **Tabla de dosificación**

Peso del niño	Edad aproximada según peso	Temperatura mayor o igual a 38 grados axilar
Menos de 11 kg	Menos de 2 años	Consulte con su médico
11 a 15 kg	2 a 3 años	5 ml
16 a 21 kg	4 a 5 años	7,5 ml
21 a 27 kg	6 a 8 años	10 ml
27 a 32 kg	9 a 10 años	12,5 ml
Más de 32 kg	Más de 10 años	15 ml

En caso necesario repita la dosis cada 8 horas. No administre más de 3 veces por día.

#### **¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOME MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?**

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

#### **¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?**

Para mayor información respecto al producto comuníquese al teléfono (011) 4788-7000 o al teléfono de ANMAT Responde 0800-333-1234.

#### **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

No utilizar después de la fecha de vencimiento

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

#### **CONSERVACIÓN**

Conservar en lugar seco y fresco, a temperatura no superior a 25°C.

#### **PRESENTACIÓN**

Envases que contienen 60, 80, 90, 120, 200 y 240 ml de suspensión.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - Certificado N° 35.918

PFIZER S.R.L.

Carlos Berg 3669, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Directora Técnica: Farmacéutica Sandra B. Maza

Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: .../.../...