

MICRONEMA
GLICERINA
LAURIL SULFOACETATO DE SODIO
SORBITOL
MICRO ENEMA

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contiene:

Glicerina: 12,50 g

Lauril Sulfoacetato de Sodio 70%: 1,29 g

Sorbitol 70%: 89,34 g

Excipientes: Citrato de sodio, Acido sórbico, Agua destilada c.s.p.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Enema evacuante/laxante osmótico salino por vía rectal.

INDICACIONES:

Constipación ocasional.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

La administración de MICRONEMA actúa sobre el colon izquierdo, no teniendo efecto sobre el resto del intestino.

MICRONEMA, a través de sus componentes, estimula la mucosa intestinal, absorbe agua al interior del intestino y humecta las heces, favoreciendo el reflejo de la evacuación del intestino dentro de los 15-30 minutos de introducida la solución en el recto.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Adultos y niños mayores de 12 años: Aplicar intrarrectalmente el contenido de 1 ó 2 pomos, con intervalo de 20 minutos entre ambos.

Niños menores de 12 años: Aplicar el contenido de 1 pomo.

Instrucciones para su uso:

1. Agitar el pomo.
2. Tomar el pomo de modo que la cánula quede hacia arriba.
3. Quitar la tapa protectora que cubre la punta de la cánula.
4. Apretar suavemente el pomo hasta hacer salir la primera gota, la que al escurrir por la cánula, lubricará su superficie y facilitará la penetración.
5. Acostarse boca abajo.
6. Introducir toda la cánula en el recto. En los niños menores de 3 años, introducir sólo la mitad.
7. Vaciar todo el contenido del pomo mediante presión manual.
8. Permanecer acostado boca abajo hasta sentir deseos de evacuar el intestino.

CONTRAINDICACIONES

Abdomen agudo. Procesos inflamatorios o sangrantes de la mucosa rectal.

ADVERTENCIAS

Si se encuentra resistencia para introducir la cánula o la solución, el procedimiento debe ser discontinuado, pues los procedimientos forzados pueden producir laceración o perforación rectal.

No administrar en caso de náuseas, vómitos o dolor abdominal de etiología desconocida.

La aplicación diaria durante períodos prolongados no es aconsejable. En caso de dolores abdominales o constipación crónica, consultar al médico antes de utilizar.

PRECAUCIONES

En caso de uso prolongado o fuertes dosis existe riesgo de hipokalemia.

Interacciones con otras drogas

No han sido señaladas interacciones.

Carcinogénesis, tumorigénesis, mutagénesis

No han sido demostradas.

Embarazo y reproducción

Por administración de MICRONEMA, no es de esperar manifestaciones adversas.

Lactancia

No está contraindicado su uso durante el período de lactancia.

Empleo en pediatría

Puede ser utilizado según prescripción médica.

Empleo en geriatría

Por administración de MICRONEMA, no es de esperar manifestaciones adversas.

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente: leves cólicos intestinales.

Raras: irritación rectal (mucus, diarrea).

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología del:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

PRESENTACIÓN:

Envase con 3 pomos conteniendo 6,2 ml cada uno.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura ambiente (rango permitido entre 15°C y 30°C).

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

No utilizar después de la fecha de vencimiento.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 33.778.

PFIZER S.R.L.

Carlos Berg 3669, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Dirección Técnica: Sandra B Maza - Farmacéutica

Fecha última revisión: Noviembre de 2000.