

PERGAMID
ANIRACETAM
Comprimidos recubiertos

Venta bajo receta

Industria Argentina

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido recubierto contiene:

ANIRACETAM 750 mg

Excipientes: Dioctilsulfosuccinato sódico, Almidón glicolato sódico, Estearato de magnesio, Hidroxipropilmetilcelulosa, Triacetina, Dióxido de Titanio, Talco, Óxido Férrico amarillo.

ACCION TERAPEUTICA:

Agente neurotrófico.

INDICACIONES:

Trastornos de la atención y la memoria de origen degenerativo o vascular.

POSOLOGIA Y MODO DE EMPLEO:

La dosis total recomendada es de 2 comprimidos por día, administrados en 1 ó 2 tomas.

EFFECTOS COLATERALES Y SECUNDARIOS:

PERGAMID es bien tolerado, aún en los pacientes ancianos.

Ocasionalmente se han reportado casos de agitación, ansiedad, intranquilidad e insomnio, efectos que desaparecieron rápidamente cuando se disminuyó la dosis administrada. Raramente se han informado epigastralgia, cefalea, somnolencia, astenia y vértigo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

El efecto terapéutico de PERGAMID se manifiesta luego de 60 días y se pone de manifiesto después de 4 meses de tratamiento. En el caso en que se evidencien síntomas como intranquilidad, ansiedad, agitación o insomnio se recomienda administrar la dosis total en una sola toma diaria por la mañana.

Estudios en animales no han evidenciado efectos teratogénicos, no obstante, no se recomienda suministrar el fármaco a mujeres embarazadas o durante el amamantamiento.

En pacientes con insuficiencia renal severa (depuración de creatinina < 10 ml/m) se aconseja disminuir la dosis.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

De la experiencia clínica no surgen interacciones farmacológicas entre aniracetam y otros fármacos.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad conocida a la droga y a cualquier otro componente de la fórmula.

SOBREDOSIFICACION:

CONSERVACION: Conservar en lugar seco y fresco, a temperaturas no superiores a los 30° C.

SOBREDOSIS:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría R. Gutiérrez (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIONES:

Envases que contienen 30 y 60 comprimidos recubiertos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
No utilizar después de la fecha de vencimiento

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD - CERTIFICADO N° 44.214

PFIZER S.R.L.
Carlos Berg 3669, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Directora Técnica: Sandra B. Maza. Farmacéutica

Para mayor información respecto del producto comunicarse al teléfono: (011) 4788-7000

Fecha última revisión: Marzo 1995